

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用 時期	本剤の 使用回数	テブコナゾール を含む農薬の 総使用回数	使用 方法												
りんご	モニリア病 斑点落葉病 黒点病 うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 赤星病	2000	200 ~700	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	散布												
	黒星病	2000~4000																	
おうとう	黒斑病 褐色せん孔病	2000		収穫前日まで				3回以内	3回以内	散布									
	灰星病 炭疽病																		
もも ネクタリン	ホモプシス腐敗病 黒星病 うどんこ病																		
	かき	炭疽病 うどんこ病 落葉病		2000 ~3000							収穫前日まで	3回以内	3回以内	散布					
なし	灰色かび病	2000																	
なし	輪紋病 黒斑病 うどんこ病	2000		収穫前日まで							3回以内				3回以内	散布			
	赤星病 黒星病	2000 ~4000																	
小粒核果類 (うめを除く)	黒星病 灰星病	2000		5~10/株													生育期ただし、 収穫前日まで	3回以内	3回以内
うめ	黒星病 すす斑病 灰星病																		
ぶどう	晩腐病 黒とう病 さび病 灰色かび病 うどんこ病 すす点病 褐斑病 白腐病																		
いちじく	株枯病	5~10/株	5~10/株	生育期ただし、 収穫前日まで	3回以内	3回以内	散布												
ねぎ わけぎ あさつき	さび病 黒斑病	1000	150 ~300	収穫14日前まで				3回以内	3回以内	散布									
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病			収穫前日まで															
しそ	さび病	4000		収穫21日前まで								2回以内	2回以内						
にんにく	葉枯病 白斑葉枯病 黄斑病	1000	100 ~300	収穫7日前まで								3回以内	3回以内	散布					
	キャベツ			菌核病							1000~2000				収穫前日まで				
にら	さび病	収穫14日前まで																	
にら(花茎)		収穫前日まで																	
しょうが	白星病	2000	収穫3日前まで	2回以内							2回以内				散布				
未成熟そらまめ	さび病	4000	収穫前日まで																
茶	炭疽病 もち病 褐色円星病	2000~3000	200 ~400	摘採7日前まで	2回以内	2回以内	散布												
	新梢枯死症 網もち病	2000																	
ホップ	うどんこ病	1000	200~700	収穫14日前まで				3回以内	3回以内	1分間 球根浸漬									
ゆり	乾腐病	50	—	植付前又は 貯蔵前				1回	1回										
チューリップ	球根腐敗病			植付前						15分間 球根浸漬									
りんどう	葉枯病 花腐菌核病	2000	200~300	発病初期				5回以内	5回以内	散布									