

ポリオキシンAL水和剤

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ポリオキシンを含む 農薬の 総使用回数		
りんご	斑点落葉病 褐斑病 赤衣病	1000	200～700	収穫3日前まで	3回以内	散布	5回以内 (散布は3回以内)		
	うどんこ病								
なし	黒斑病 褐色斑点病	1000		500～1000	収穫7日前まで			5回以内	5回以内(イミノクダジン 酢酸塩・ポリオキシン 水和剤は3回以内)
	ぶどう								
みかん	赤衣病	収穫14日前まで							
メロン	うどんこ病	1000		100～300	収穫前日まで			2回以内	5回以内(塗布は1回以内)
きゅうり									
いちご			灰色かび病		収穫開始 14日前まで				
トマト	葉かび病		500		100～300	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
	レタス								
にんじん	黒葉枯病				100～300	収穫7日前まで	5回以内	5回以内	
ねぎ	黒斑病	ネギアザミウマ		発生初期 但し、 収穫14日前まで					3回以内
	たまねぎ		灰色かび病		500～750	収穫3日前まで	5回以内		
	小菌核病	500							
	ねぎアザミウマ								
からまつ	先枯病	500～1000	300～700	—	8回以内	8回以内			