

ダントツ水溶剤												
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数					
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イネドロオイムシ イネアザミウマ	4000倍	60～150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)					
	ウンカ類 カメムシ類 イネドロオイムシ	1000倍	25L/10a									
稲(箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタホシコバエ	200倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り500ml	移植3日前～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)					
	イネドロオイムシ イネミズウムシ	200～400倍										
りんご	カメムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 コナカイガラムシ類 リンゴワタムシ ケムシ類 コガネムシ類成虫	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内					
なし	シンクイムシ類 アブラムシ類 コナカイガラムシ類 カメムシ類 ケムシ類 チュウゴクナシキジラミ											
もも	アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類	2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内					
ネクタリン	アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類											
ネクタリン	アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内					
おうとう	オウトウシヨウジョウハエ カメムシ類	2000倍										
うめ	ケシスイ類 クビアカツヤカミキリ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内					
すもも	アブラムシ類 ケムシ類 カメムシ類											
あんず	アブラムシ類	4000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内					
ぶどう	コナカイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ ブドウトラカミキリ カメムシ類 コガネムシ類	2000～4000倍										
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ アザミウマ類 ケンキスイ類 コアオハナムグリ ツノロウムシ コナカイガラムシ類 ゴマダラカミキリ カメムシ類 アゲハ類 アカマルカイガラムシ ナシマルカイガラムシ ミカンバエ ミカンキジラミ コナジラミ類 アオバハゴロモ	24倍	4～8L/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	6回以内(樹幹散布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)					
	カナタタキ	2000倍	200～700L/10a									
	かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ アゲハ類 アブラムシ類	20倍					10～100ml/樹	収穫150日前まで	3回以内	無人航空機による散布	6回以内(樹幹散布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)
		ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ	20倍					100ml/樹				
		ミカンキジラミ	40倍					200ml/樹				
	かき	カキノヒメヨコバイ アザミウマ類 コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ カメムシ類	2000～4000倍					200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
いちじく	アザミウマ類 カミキリムシ類	2000倍										
びわ	アブラムシ類 カメムシ類 カイガラムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内					
なつめ	ゴマダラカミキリ	4000倍										
さんしょう(果実)	アザミウマ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内					
オリーブ	オリーブアナアキゾウムシ マエアカスカシノメイガ	2000倍										
オリーブ(葉)	オリーブアナアキゾウムシ マエアカスカシノメイガ	4000倍	200～700L/10a	収穫120日前まで	3回以内	散布	3回以内					
マンゴー	アザミウマ類 コナカイガラムシ類	2000～4000倍										
パパイヤ	ナガカタカイガラムシ ヒラタカタカイガラムシ	2000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内					
ブルーベリー	アブラムシ類 ケムシ類 オウトウシヨウジョウハエ	2000～4000倍										
キウイフルーツ	キウイヒメヨコバイ カメムシ類 アオバハゴロモ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内					
パイナップル(苗木)	パイナップルコナカイガラムシ	2000倍										
未成熟とうもろこし	アブラムシ類 アカスジカスミカメ ツマジロクサオウ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内					
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ アブラムシ類 コナジラミ類 カメムシ類	2000～4000倍										
メロン	アブラムシ類 コナジラミ類 ミナミキイロアザミウマ ウリハムシ ハモグリバエ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)					
すいか	アブラムシ類 ウリハムシ ミナミキイロアザミウマ	2000倍										
にがうり	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)					
かぼちゃ	アブラムシ類 ウリハムシ カボチャミバエ	2000倍										
とうがん	ミナミキイロアザミウマ	2000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)					
食用へちま	アブラムシ類	2000倍										
なす	ミナミキイロアザミウマ ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類 テントウムシダマシ カメムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)					
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類	2000～4000倍 2000倍										
ピーマン	アブラムシ類 コナジラミ類 カメムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内(定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)					
とうがらし類	アブラムシ類 コナジラミ類 ミナミキイロアザミウマ	2000～4000倍 2000倍										
キャベツ	アブラムシ類 アザミウマ類 アオムシ コナガ	2000～4000倍 2000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内)					
はくさい	アブラムシ類 アオムシ コナガ	2000～4000倍 2000倍										
ブロッコリー	アブラムシ類 アオムシ コナガ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)					
はなっこりー	アブラムシ類	2000倍										
だいこん	アブラムシ類 ダイコンハムシ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、は種後は2回以内)					
かぶ	アブラムシ類	2000倍										
非結球あぶらな科 葉菜類(にまつな、 チンゲンサイ、なば な類、みずなを除く)	アブラムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)					
こまつな	アブラムシ類	2000倍										
チンゲンサイ	アブラムシ類 ハモグリバエ類	2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)					
みずな	アブラムシ類	2000倍										
しゅんぎく	アブラムシ類 ハモグリバエ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)					
レタス	アブラムシ類 アザミウマ類 ナモグリバエ	2000倍										
非結球レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	2000～4000倍 2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内)					
ねぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	2000～4000倍										
わけぎ あさつき	アブラムシ類 ネギアザミウマ	2000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内)					
にら	ネギネクロバネキノコバエ	2000倍										
にら(花茎)	アブラムシ類 ネギアザミウマ	4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、定植後は3回以内)					
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシダマシ類	1000倍										
かんしょ	アブラムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、定植後は2回以内)					
やまのいも	アブラムシ類	2000倍										
てんさい	テンサイビハムシ カメコハムシ テンサイモグリハバエ アブラムシ類	100～200倍	1L/バーネット1冊 (3L/m ²)	定植前	1回	灌注	4回以内(定植前の灌注は1回以内、散布は3回以内)					
豆類(種実、ただし、 だいず、あずき、い んげんまめ、らっか せいを除く)	アブラムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、定植後は3回以内)					
あずき	アブラムシ類 マメホソクシゾウムシ	2000倍										
いんげんまめ	アブラムシ類 カメムシ類 インゲンマゾウムシ	2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)					
だいず	マメシクイガ アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ	2000倍										
豆類(未成熟、ただし、 えだまめを除く)	アブラムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、定植後は3回以内)					
えだまめ	アブラムシ類 フタスジヒメハムシ マメシクイガ	2000倍										
オクラ	アブラムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)					
ほうれんそう	アブラムシ類	4000倍										
みつば	アブラムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)					
パセリ	アブラムシ類	4000倍										
せり	アブラムシ類	2000倍	200～700L/10a	親株養成期但し 収穫45日前まで	3回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)					
セルリー	アブラムシ類 ハモグリバエ類	2000～4000倍 2000倍										
アスパラガス	アブラムシ類 ネギアザミウマ ジュウシホシクビナガハムシ カメムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)					
みょうが(花穂)	アブラムシ類	2000倍										
みょうが(莖葉)	アブラムシ類	2000倍	200～700L/10a	みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合に あつては開花期終了まで	3回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、定植後は3回以内)					
れんこん	クワイクビレアブラムシ	2000～4000倍										
くわい	アブラムシ類	2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、定植後は3回以内)					
茶	チャトゲコナジラミ マダラカサハラハムシ チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホリガ ツマクロアオカスミカメ コミカンアブラムシ	2000～4000倍										
きく	ナモグリバエ アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 カメムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	発生初期	4回以内	生育期株元灌注	4回以内					
ばら	アザミウマ類 コガネムシ類	2000倍										
花き類・観葉植物	アブラムシ類 アザミウマ類	2000～4000倍	200～700L/10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内					
デイゴ	デイゴヒメコバチ	2000倍										
げきつ	ミカンキジラミ	40倍	200～700L/10a	生育期	4回以内	樹幹散布	5回以内					
さら	クビアカツヤカミキリ	2000倍										
つつじ類	ツツジジンバイ	2000～4000倍	200～700L/10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内					
たであい	アブラムシ類	2000倍										
わた	アブラムシ類	2000倍	200～700L/10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内					
わた	アブラムシ類	2000倍										