

作物名	適用害虫名	使用薬量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサミルを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	ジャガイモシストセンチュウ ジャガイモシロシストセンチュウ	30kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和	1回
	ネグサレセンチュウ	20kg/10a			植溝処理土壌混和	
アブラムシ類	1.5～2.5g/株		育苗期		株元処理	
なす	ミナミキイロアザミウマ	1～2.5g/株				
ピーマン	アブラムシ類	1.5～2.5g/株				定植前
	ミナミキイロアザミウマ	1～2.5g/株				
メロン(地床)	ミナミキイロアザミウマ	1～2.5g/株	育苗期		株元処理	2回以内(育苗期の株元処理は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内)
メロン(揚床)		1g/株				
メロン	ネコブセンチュウ	40～50kg/10a	定植前		全面土壌混和	
にがうり		40kg/10a				
きゅうり	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	25～50kg/10a	は種前又は定植前			
	アブラムシ類		定植前			
	ミナミキイロアザミウマ	1～2.5g/株	育苗期	株元処理		
すいか	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	25～35kg/10a	は種前又は定植前	全面土壌混和		
	ミナミキイロアザミウマ	1～2.5g/株	育苗期	株元処理		
	アブラムシ類	1.5～2.5g/株				
とうがん	ミナミキイロアザミウマ	2.5g/株	定植時	植穴処理		
レタス	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	40～50kg/10a	定植前	全面土壌混和		
リーフレタス		40kg/10a	定植前但し、 収穫75日前まで			
トマト ミニトマト		25～50kg/10a	定植前			
だいこん	ネコブセンチュウ アブラムシ類	25～50kg/10a	は種前		全面土壌混和	
	ネグサレセンチュウ	20～50kg/10a				
にんじん	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～37g/10a			播溝土壌混和	
もりあざみ	ミタネグサレセンチュウ	40～50kg/10a	全面土壌混和			
かんしょ	ネコブセンチュウ	30～40kg/10a	植付前 (挿苗前)		作条土壌混和	
やまのいも		40～50kg/10a	植付前		全面土壌混和	
さといも	ネグサレセンチュウ	40kg/10a				
だいず	ダイズシストセンチュウ	6kg/10a	は種前又は定植前	作条土壌混和		
		30kg/10a	は種前	全面土壌混和		
6kg/10a		作条土壌混和				
あずき		30kg/10a	全面土壌混和			
えだまめ		6kg/10a	は種前又は定植前	作条土壌混和		
		30kg/10a		全面土壌混和		
にんにく	イモグサレセンチュウ	30～50kg/10a	植付前	全面土壌混和		
たばこ	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	37kg/10a	定植前	作条土壌混和		