

アルバリン粒剤							
作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ イネドロオイムシ カメムシ類	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	
きゅうり	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	
	コナジラミ類	1~2g/株					
	アブラムシ類	1g/株					
	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	定植時				
	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2g/株	生育期 但し、 収穫開始14日前まで	株元散布			
	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2g/株	定植時	植穴土壌混和			
うり類 (漬物用)	アザミウマ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	
にがうり	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2g/株					
	コナジラミ類	2g/株					
メロン	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和合計1回以内、散布は2回以内)	
	コナジラミ類	1~2g/株					
	アブラムシ類	1g/株					
	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	定植時				
コナジラミ類	1~2g/株						
アブラムシ類	1g/株						
すいか	ワタアブラムシ	2g/株	生育期 但し、 収穫21日前まで	1回	株元散布	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	
			育苗期				
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布2回以内)	
ズッキーニ	アブラムシ類		生育期 但し、 収穫開始14日前まで		株元散布		
トマト ミニトマト	コナジラミ類	培土1L当り10g	は種前	1回	培土混和	5回以内 (培土混和及び灌水は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	1~2g/株	育苗期		株元散布		
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴土壌混和		
	コナジラミ類 アブラムシ類		生育期 但し、 収穫前日まで		2回以内		株元散布
とうがらし類	アザミウマ類	1~2g/株	育苗期	1回	1回	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	
	アブラムシ類	1g/株	定植時				
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、 収穫開始14日前まで				
とうがらし(葉)	アザミウマ類 アブラムシ類	1g/株	定植時 但し、 収穫30日前まで	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	
なす	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	
	コナジラミ類	1~2g/株					
	アブラムシ類	1g/株					
	ハモグリバエ類 コナジラミ類 アザミウマ類	1~2g/株	定植時				
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、 収穫前日まで		2回以内		株元散布
	コナジラミ類	1g/株					
ピーマン	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	育苗期	1回	1回	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	
	アザミウマ類	1~2g/株	定植時				
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、 収穫前日まで				
キャベツ	ハイマダラノメイガ	3g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌水は合計1回以内、散布2回以内)	
	アブラムシ類	2g/株	育苗期		株元散布		
はくさい	アオムシ コナガ	2~3g/株	定植時	1回	1回	3回以内 (定植時の土壌混和及び灌水は合計1回以内、散布は2回以内)	
	アブラムシ類	2g/株					
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ	2g/株	定植時	1回	1回	3回以内 (定植時の土壌混和及び灌水は合計1回以内、散布は2回以内)	
レタス 非結球レタス	ナモグリバエ	培土1L当り15g	は種前	1回	培土混和	4回以内 (は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌水は合計1回以内、散布は2回以内)	
		1g/株	育苗期後半		株元散布		
	アブラムシ類 ナモグリバエ	2g/株	定植時		植穴土壌混和		
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6kg/10a	は種時	2回以内	播溝土壌混和	4回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌水及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌水は1回以内、散布及び定植後の株元散布は2回以内)	
			定植時				
	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6~9kg/10a	生育期 但し、 収穫3日前まで		株元散布		
わけぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6kg/10a	生育期 但し、 収穫21日前まで	1回	1回	4回以内 (定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元灌水は1回以内、散布2回以内)	
にんじん	ハモグリバエ類	9kg/10a	は種時	1回	1回	4回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌水は1回以内、散布2回以内)	
だいこん	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	全面土壌混和	5回以内 (は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計2回以内)	
	キスジノミハムシ	4~6kg/10a					
		9~12kg/10a					
タネバエ	6kg/10a	生育期 但し、 収穫30日前まで	散布				
キスジノミハムシ		定植時	土壌混和				
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	6kg/10a	定植時	1回	1回	3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	
非結球あぶらな科 葉菜類(チンゲンサイ除く) かぶ	アブラムシ類 キスジノミハムシ		は種時				播溝土壌混和
なばな類	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	1回	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	
ほうれんそう							
セルリー	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	1回	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	
いちご	ワタアブラムシ	0.5~1g/株	定植時	1回	1回	1回	
くわい	アブラムシ類	3kg/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内	
らっきょう	アザミウマ類	6kg/10a	生育期 但し、収穫前日まで				
オクラ	アブラムシ類	9kg/10a	生育期 但し、収穫開始14日前まで	1回	株元散布	3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内)	
しょうが	クロバネキノコバエ類		生育期 但し、 収穫14日前まで				
さやえんどう 実えんどう	ハモグリバエ類		生育期 但し、収穫開始14日前まで				
さやいんげん	アブラムシ類						
だいず	フトスジヒメハムシ	6kg/10a	は種時	1回	1回	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	
しそ	マデイラコナカイガラムシ	2g/株(但し、 10a当り25kgまで)	定植時	1回	1回	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布2回以内)	
食用ぎく	アブラムシ類	1g/株(但し 10a当り30kgまで)					
	マメハモグリバエ	2g/株(但し 10a当り30kgまで)	は種時	1回	1回	3回以内 (は種時及び定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	
しゅんぎく	ハモグリバエ類	9kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内 (は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	
			定植時		植溝土壌混和		
ふき	アブラムシ類	20kg/10a	定植後~生育期 (草丈20cm頃まで) 但し、収穫45日前まで	1回	1回	3回以内 (土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)	
葉ごぼう	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	全面土壌混和	2回以内 (は種時の全面土壌混和は1回以内、生育期の株元散布は1回以内)	
			生育期 但し、 収穫21日前まで		株元散布		
茶	クワシロカイガラムシ	12kg/10a	摘採7日前まで	2回以内	株元土壌混和	2回以内	
さとうきび	カンジャコバネナガカメムシ	6~9kg/10a	生育期 但し、 収穫45日前まで	2回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤は3回以内)	
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	20g/株	育苗期	5回以内	株元散布	5回以内	
きく ガーベラ	マメハモグリバエ	2g/株(但し10a当り 30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以内)	
	コナジラミ類	1g/株(但し10a当り 30kgまで)					
	アブラムシ類	20kg/10a	生育期				
花き類・観葉植物(きく、 ガーベラを除く)	コナジラミ類	1g/株(但し10a当り 30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和		
	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布		
つつじ類	ツツジゲンバイ	6kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内	