

カネマイトフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	散布液量(L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセキノシルを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	ミカンハダニ チャノホコリダニ ミカンサビダニ	1000~1500	200~700	収穫7日前まで	1回	散布	1回	
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ							
なし	ハダニ類	1000		収穫前日まで				
	ニセナシサビダニ							
もも	ハダニ類	1000~1500		収穫7日前まで				
	モモサビダニ	1000		収穫7日前まで				
ネクタリン	ハダニ類	1000~1500		収穫3日前まで				
	モモサビダニ	1000		収穫7日前まで				
マンゴー ゴレンシ うめ	ハダニ類			1000				収穫3日前まで
すもも		収穫7日前まで						
おうとう		1000~1500						収穫3日前まで
ぶどう		1000						収穫7日前まで
あけび(果実) パパイヤ		1000						収穫14日前まで
さんしょう(果実)		1000	収穫3日前まで					
ホップ		1000	収穫30日前まで					
未成熟とうもろこし ヤングコーン		1000	収穫21日前まで					
きゅうり うり類(漬物用) すいか いちご メロン		1000~1500	収穫前日まで					
かぼちゃ		1000	収穫7日前まで					
なす	1000~1500	150~300	収穫前日まで					
ピーマン	チャノホコリダニ			1000				
はすいも(葉柄)	ハダニ類			1500				
さといも(葉柄)				1000~1500				
やまのいも				1000~1500				
食用ぎく あずき				1500				
しそ	カンザワハダニ			1500	収穫7日前まで			
きく(葉)	ハダニ類			1000~1500	2回以内	2回以内		
エンサイ	カンザワハダニ			1000				
食用パンジー	ハダニ類			1000~1500	収穫3日前まで	1回	1回	
食用カーネーション		収穫7日前まで						
茶	カンザワハダニ	200~400	摘採7日前まで	150~300	1回			
花き類・観葉植物 (ばら、きく、カー ネーション、デル フィニウムを除く)	ハダニ類	1000	—					
きく カーネーション		1000~1500						
デルフィニウム	シクラメンホコリダニ ハダニ類	1000						