

サンマイルト水和剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数	散布液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリダベンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ ミカンサビダニ ミカントゲコナジラミ (若齢幼虫)	2000～ 3000倍	200～ 700L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
	チャノキイロアザミウマ	2000倍					
	チャノホコリダニ リュウキュウミカンサビダニ	3000倍					
りんご	リンゴハダニ	1000～ 3000倍		収穫21日前まで	1回		1回
	ナミハダニ リンゴサビダニ	1000～ 1500倍					
なし	ニセナシサビダニ アブラムシ類 ハダニ類(ミカンハダニを除く) チュウゴクナシキジラミ	1000～ 1500倍		収穫3日前まで	1回		1回
	ミカンハダニ	2000～ 3000倍					
もも	ハダニ類 モモサビダニ	1000～ 1500倍		収穫14日前まで	1回		1回
	アブラムシ類	1000倍					
すもも	ハダニ類	1000～ 1500		収穫21日前まで	1回		1回
おうとう				収穫90日前まで			
ぶどう				チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ			
びわ	ミカンハダニ	2000～ 3000倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内
	ビワサビダニ ビワキジラミ	3000倍					
いちじく	ハダニ類 イチジクモンサビダニ	1000～ 1500倍		収穫45日前まで	1回		1回
かき	ハダニ類 チャノキイロアザミウマ カキサビダニ	1000倍	収穫14日前まで	2回以内	2回以内		
	カキノヒメヨコバイ	1500倍					
キウイ フルーツ	キウイヒメヨコバイ	1500～ 3000倍	収穫30日前まで	2回以内	2回以内		
	チャノホコリダニ	1500倍					
マンゴー	チャノホコリダニ ハダニ類	1000～ 1500倍	収穫後から 開花前まで	1回	1回		
さんしょう (果実)	ハダニ類	3000倍	収穫14日前まで	2回以内	2回以内		
グアバ (果実)	ミカンワタコナジラミ	2000倍					