ダニサラバフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量 L/10a	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シフルメトフェンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ	1000～2000	200～1000	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
りんご	ハダニ類	1000	200～700				
ぶどう	ハダニ類 ブドウヒメハダニ	1000					
びわ かき	ハダニ類	1000					
なし もも おうとう ネクタリン 小粒核果類 いちじく	ハダニ類	1000～2000					
アスパラガス	ハダニ類	1000	100～500				
ホップ すいか メロン いちご なす きゅうり ピーマン やまのいも モロヘイヤ みつば みょうが（花穂） さやいんげん かんしょ しそ科葉菜類 なんてん（葉） てんさい	ハダニ類	1000	100～350				
みょうが（茎葉）	ハダニ類	1000		みょうが（花穂）の収穫前日まで、ただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで			
食用ぎく とうがん	ハダニ類	1000		収穫3日前まで			
茶	カンザワハダニ	1000～2000	200～400	摘採7日前まで			
花き類･観葉植物	ハダニ類	1000	100～350	発生初期			