

エムダイファー水和剤

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンネブを含む農薬の総使用回数	
みかん	黒点病 小黒点病	600～800倍	200～ 700L/10a	収穫60日 前まで	2回以内	散布	2回以内	
	ミカンサビダニ	1000倍		収穫90日 前まで				
かんきつ (みかんを除く)	黒点病 小黒点病	600～800倍			1000倍		収穫30日 前まで	1回
	ミカンサビダニ	1000倍		収穫45日 前まで				3回以内
りんご	黒点病	400～650倍			100～ 300L/10a		2回以内	2回以内
なし	赤星病			7回以内				4回以内
かき	落葉病 炭疽病						100L/10a	
ばれいしょ	疫病	600倍		収穫21日 前まで	4回以内			4回以内
せんきゅう	べと病		100L/10a			収穫14日 前まで	8回以内	
とうき		灰色かび病 炭疽病 べと病 さび病		400～650倍	100～ 300L/10a			発病初期
ばら きく カーネーション	褐色斑点病	500倍	300L/10a	床替活着後		8回以内		
チューリップ	赤枯病	400～600倍			300L/10a		床替活着後	8回以内
すぎ								