

オンリーワンフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用 時期	本剤の 使用回数	テブコナゾール を含む農薬の 総使用回数	使用 方法	
りんご	モニリア病 斑点落葉病 黒点病 うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 赤星病	2000	200～700	収穫7日前ま で	3回以内	3回以内	散布	
	黒星病	2000～4000						
おうとう	黒斑病 褐色せん孔病	2000		収穫前日ま で				
	灰星病 炭疽病							
もも ネクタリン	ホモプシス腐敗病 黒星病 うどんこ病							
かき	炭疽病 うどんこ病 落葉病	2000～3000		200～700				収穫前日ま で
	灰色かび病	2000						
かき(葉)	炭疽病 うどんこ病 落葉病	3000		収穫21日前 まで				
なし	輪紋病 黒斑病 うどんこ病	2000		2000 ～4000				3回以内
	赤星病 黒星病							
小粒核果類 (うめを除く)	黒星病 灰星病	2000	5～10/株	生育期ただし、 収穫前日まで	3回以内	3回以内	散布	
うめ	黒星病 すす斑病 灰星病							
ぶどう	晩腐病 黒とう病 さび病 灰色かび病 うどんこ病 すす点病 褐斑病 白腐病							
いちじく	株枯病		5～10/株	生育期ただし、 収穫前日まで			灌注	
ねぎ	さび病 黒斑病	1000	150～300	収穫14日前 まで	3回以内	3回以内	散布	
		8	1.6				無人航空機に よる散布	
		16	2.4～3.2					
わけぎ あさつき		1000	150～300	収穫前日ま で	3回以内	3回以内	散布	
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病	8	1.2～2.0				無人航空機に よる散布	
		16	2.4～4.0					
しそ	さび病	4000	150～300	収穫21日前ま で	2回以内	2回以内	散布	
にんにく	さび病 葉枯病 白斑葉枯病 黄斑病	1000	100～300	収穫7日前ま で	3回以内	3回以内	無人航空機に よる散布	
		8	0.8～2.4					
		16	1.6～2.4					
キャベツ	菌核病	1000～2000	100～300	収穫前日ま で	3回以内	3回以内	散布	
にら	収穫14日前ま で							
にら(花茎)	収穫前日ま で							
しょうが	白星病	2000	200～400	収穫3日前ま で	3回以内	3回以内	無人航空機に よる散布	
		32						3.2
		50						3.2～6.5
		100						5～13
未成熟そらまめ	さび病	4000	100～300	収穫前日ま で	2回以内	2回以内	散布	
やまのいも やまのいも(むかご)	炭疽病 葉渋病	1000	100～300	収穫7日前ま で	3回以内	3回以内	無人航空機に よる散布	
		16	1.6～3.2					
		32	3.2～6.4					
茶	炭疽病 もち病 褐色円星病	2000～3000	200～400	摘採7日前ま で	2回以内	2回以内	散布	
	新梢枯死症 網もち病	2000						
ホップ	うどんこ病	1000	200～700	収穫14日前ま で	3回以内	3回以内		
ゆり	乾腐病	50	—	植付前又は 貯蔵前	1回	1回	1分間 球根浸漬	
チューリップ	球根腐敗病			植付前			15分間 球根浸漬	
りんどう	葉枯病 花腐菌核病	2000	200～300	発病初期	5回以内	5回以内	散布	