

グリーンペンコゼブ水和剤

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	10a当り 散布液量 (L)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	マンゼブを含 む農薬の総 使用回数
すいか	炭疽病 つる枯病	400～600	100～300	収穫7日前まで	7回以内	散布	7回以内
	褐色腐敗病	600					
メロン	つる枯病 べと病	400～600		5回以内	5回以内		5回以内
きゅうり	炭疽病 褐斑病 黒星病	600		収穫前日まで			
	べと病	600～800		3回以内	3回以内		
キャベツ	べと病	400～600					収穫30日前まで
ねぎ	べと病 黒斑病 さび病	600		収穫14日前まで	5回以内		5回以内
	たまねぎ	べと病 黒斑病 灰色かび病		400～600			
はくさい	べと病 黒斑病 白斑病	600		収穫30日前まで	1回		1回
	アスパラガス (露地栽培)	斑点病 茎枯病		500	収穫終了後 但し、秋期まで		6回以内
かぼちゃ	べと病 疫病	600	収穫21日前まで	2回以内	2回以内		
ばれいしょ	夏疫病	400～600	25	収穫7日前まで	10回以内	10回以内(無人航空機散布は3回以内)	
	疫病						100
だいず	べと病 紫斑病	400	100～300	収穫45日前まで	3回以内	3回以内	
あずき	さび病	400～600	100～300	収穫30日前まで	5回以内	5回以内	
てんさい	褐斑病		125	25			収穫21日前まで