

クローロピクリン					
作物名	適用病害虫名	1穴当り 使用量 (ml)	本剤の 使用回数	使用 方法	クローロピクリン を含む農薬の 総使用回数
あぶらな科野菜 (キャベツを除く)	萎黄病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ケラ、 ネキリムシ類、一年生雑草	(床土・堆肥) 3~5 (圃場) 2~3	1回		1回
だいこん	亀裂褐変症				
はくさい	黄化病、軟腐病、 根くびれ病				
かぶ	根こぶ病				
キャベツ	萎黄病、根こぶ病、 センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、ケラ、 一年生雑草		2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)		2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)
レタス、 非結球レタス (サラダ菜を除く)	ビッグベイン病	(圃場) 3	1回		1回
	根腐病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草	(床土・堆肥) 3~5 (圃場) 2~3			
サラダ菜	ビッグベイン病	(圃場) 3	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)		2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)
	根腐病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草	(床土・堆肥) 3~5 (圃場) 2~3			
くちしや	ビッグベイン病	(圃場) 3			
	根腐病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草	(圃場) 2~3			
ほうれんそう	萎凋病、株腐病、立枯病、 苗立枯病、根腐病、 ホウレンソウケナゴコナダニ センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、ケラ、 一年生雑草	(床土・堆肥) 3~5 (圃場) 2~3	1回		1回
うり科野菜 (すいか、きゅうり、 メロンを除く)	疫病、つる割病、白絹病、 センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、ケラ、 一年生雑草				
きゅうり	苗立枯病、疫病、つる割病、 白絹病、ホモプシス根腐病、 センチュウ類、ネキリムシ類、 ハリガネムシ類、ケラ、 一年生雑草	(床土・堆肥) 3~5 (圃場) 2~3	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)		2回以内 (床 土1回以内、 圃場1回以内)
	ホモプシス根腐病	(圃場) 1穴当り3ml			
メロン	疫病、つる割病、白絹病、 黒点根腐病、苗立枯病、 センチュウ類、ネキリムシ類、 ハリガネムシ類、ケラ、 一年生雑草	(床土・堆肥) 3~5 (圃場) 2~3			
かぼちゃ (かぼちゃ台 を含む)	フザリウム立枯病	(床土・堆肥) 3~6	1回		1回
	一年生雑草	(圃場) 3~4			
すいか	疫病、苗立枯病、つる割病、 白絹病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草				
ピーマン とうがらし類	青枯病、萎凋病、疫病、 センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、ケラ、 一年生雑草		2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)		2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)
トマト ミニトマト	半身萎凋病、萎凋病、苗立枯病、 疫病、青枯病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類 ケラ、一年生雑草				
なす	青枯病、疫病、苗立枯病、 半身萎凋病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草		1回		1回
いちご	萎黄病、炭そ病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草		2回以内(床土 1回以内、 圃場1回以内)		2回以内(床土 1回以内、 圃場1回以内)
アスパラガス	立枯病、紋羽病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草		1回	土壌くん蒸	1回
セルリー	萎黄病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草		2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)		2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)
しょうが	根茎腐敗病、一年生雑草				
うど	萎凋病、一年生雑草				
にんじん	こぶ病、しみ腐病、紋羽病、 センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、ケラ、 一年生雑草	(床土・堆肥) 3~5 (圃場) 2~3			
ごぼう	黒あざ病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草				
かんしょ	立枯病、つる割病、紋羽病、 センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、ケラ、 一年生雑草		1回		1回
さといも	疫病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草				
やまのいも	褐色腐敗病、根腐病、 センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、ケラ、 一年生雑草				
やまのいも (むかご)					
ばれいしょ	青枯病、亀の甲症、 そうか病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草				
ねぎ、 あさつき、 わけぎ	萎凋病、苗立枯病、白絹病、 センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、ケラ、 一年生雑草		2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)		2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)
たまねぎ	疫病、苗立枯病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草				
こんにやく	乾腐病、白絹病、根腐病、 紋羽病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草				
パセリ	立枯病、一年生雑草				
にんにく	イモグサレセンチュウ、 一年生雑草				
にら	紅色根腐病				
みょうが(花穂)、 みょうが(茎葉)	根茎腐敗病	(圃場) 3			
オクラ ふき	半身萎凋病		1回		1回
薬用にんじん	根腐病、一年生雑草				
豆類(種実、ただし、 いんげんまめ、えんどうまめ を除く)、豆類(未成熟、 ただし、さやいんげん、 未成熟そらまめ、 さやえんどう、 実えんどうを除く)	立枯病、白絹病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草				
えんどうまめ、 さやえんどう、 実えんどう	苗立枯病、根腐病、萎凋病、 立枯病、白絹病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケ ラ、一年生雑草				
いんげんまめ	立枯病、根腐病、白絹病、 センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、ケラ、 一年生雑草	(床土・堆肥) 3~5 (圃場) 2~3			
さやいんげん			2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)		2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)
未成熟そらまめ	立枯病、白絹病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草				
てんさい	黒根病、苗立枯病、 センチュウ類、ハリガネムシ、 ネキリムシ、ケラ、 一年生雑草				
たばこ	疫病、黒根病、立枯病、白絹病、 わい化病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草				
	立枯病	(圃場) 2	1回	深層土 壌くん蒸	1回
あま、麦類	立枯病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草				
とうもろこし	白絹病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 ケラ、一年生雑草				
陸稲	センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草				
花き類・観葉植物	青枯病、半身萎凋病、 萎凋病(フザリウム菌)、 萎黄病(フザリウム菌)、 株枯病(フザリウム菌)、 乾腐病(フザリウム菌)、 球根腐敗病(フザリウム菌)、 立枯病(フザリウム菌)、 葉枯病(フザリウム菌)、 腐敗病(フザリウム菌)、 センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、ケラ、 一年生雑草	(床土・堆肥) 3~5 (圃場) 2~3	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)	土壌くん蒸	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)
	きく	立枯病、白絹病、			
カーネーション	萎凋細菌病、立枯病、				
りんどう	褐色根腐病				
しゃくやく、ぼたん	根黒斑病				
百日草	苗立枯病、一年生雑草				
宿根かすみそう	立枯病、一年生雑草				
かんきつ(苗木)	温州萎縮病	(圃場) 5(40L/10a)	1回		1回
りんご、桑	紋羽病	5~10			
トルコギキョウ	根腐病	(床土・堆肥) 3~5 (圃場) 2~3	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)		2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)