

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	ジエトフェンカルブ を含む農薬の 総使用回数	チオファネートメチル を含む農薬の 総使用回数	使用方法
みかん	そうか病	1000～ 1500	200～ 700	収穫7日前まで	5回以内	5回以内	8回以内 (塗布は3回以内、 散布、空中散布及び 無人航空機散布 は合計5回以内)	散布
	かんきつ (みかんを除く)	灰色かび病		1000～ 2000			開花期	
そうか病		1500		収穫21日前まで				
ぶどう	灰色かび病	1000～ 1500		収穫45日 前まで	3回以内	3回以内	5回以内 (塗布は3回以内、 休眠期の散布は1回以 内、生育期の散布は 1回以内)	
うめ	黒星病	1000		収穫21日前まで			10回以内 (塗布は3回以内、 休眠期の散布 は1回以内、生育期の 散布は6回以内)	
	灰色かび病	1000～ 1500		収穫7日前まで				
かき	落葉病 炭疽病	1000		収穫開始21日前 まで	5回以内	5回以内	4回以内 (種子への処理は 1回以内、 は種後は3回以内)	
いちご	炭疽病							
たまねぎ	灰色腐敗病							
キャベツ	菌核病	1500		100～ 300	収穫7日前まで	2回以内	3回以内	
いんげんまめ	炭疽病	1000	4回以内					4回以内
	灰色かび病	1000～ 1500						
あずき	菌核病	1000				4回以内	4回以内	
	輪紋病 炭疽病							
さやえんどう 実えんどう	灰色かび病	1500	100～ 300	収穫前日まで	3回以内	3回以内	4回以内 (種子への処理は 1回以内、 は種後は3回以内)	
えだまめ	紫斑病 莢汚損症			収穫7日前まで				
だいず	紫斑病	1000		収穫14日前まで			4回以内 (種子粉衣は 1回以内)	4回以内 (種子への処理 は1回以内)
		乾燥種子 重量の 0.5%	—	は種前	1回			
トマト	灰色かび病 菌核病 葉かび病	1000～ 1500	100～ 300	収穫前日まで	5回以内	6回以内	散布	
ミニトマト					3回以内	3回以内		
きゅうり	灰色かび病 菌核病 褐斑病 炭疽病	1500			5回以内	6回以内 (種子への処理は 1回以内、 は種後は5回以内)		
すいか	炭疽病			収穫21日前まで	5回以内	5回以内		
なす	灰色かび病 菌核病	1000～ 1500		収穫前日まで				
	黒枯病			収穫7日前まで				
レタス	灰色かび病 菌核病	1500		2回以内	4回以内 (種子への処理は 1回以内、 灌注は1回以内、 散布は2回以内)			
ズッキーニ	灰色かび病	1000		—	3回以内	3回以内		4回以内 (種子への処理は 1回以内、 は種後は3回以内)
花き類・ 観葉植物 (ひまわり、 ゼラニウムを除く)								
ひまわり ゼラニウム					灰色かび病 斑点病			
樹木類 (ハイドランジア、 やなぎを除く)			灰色かび病		200～ 700	感染期～ 発生初期	5回以内	5回以内
やなぎ	炭疽病	—						
ハイドランジア	輪斑病		感染期～ 発生初期					
	灰色かび病							