

スターナ水和剤

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシリニック酸を含む農薬の総使用回数	
稲	もみ枯細菌病 苗立枯細菌病 褐条病	20倍	—	浸漬前	1回	10分間 種子浸漬	1回	
		7.5倍	乾燥種籾1kg 当り30ml	浸漬前				浸漬後
	24時間 種子浸漬							
	400倍					—		48～72時間 種子浸漬
	200倍							5～24時間 種子浸漬
	400～800倍							5時間 種子浸漬
	もみ枯細菌病	200倍	—	浸種後		種子粉衣 (湿粉衣)		
苗立枯細菌病 褐条病	乾燥種子重量の 0.3～0.5%	—	浸種前	種子粉衣 (湿粉衣)				
	乾燥種子重量の 0.5%							
なし	枝枯細菌病	1000倍	200～ 700L/10a	収穫45日前まで	3回以内	3回以内		
もも ネクタリン	せん孔細菌病			収穫7日前まで				
小粒核果類(すもも を除く)	かいよう病							
すもも	かいよう病 黒斑病							
はくさい キャベツ	軟腐病 黒斑細菌病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内		
ブロッコリー							花蕾腐敗病	
だいこん	軟腐病	1000倍	100～ 300L/10a	収穫14日前まで	5回以内	5回以内		
カリフラワー		2000倍			2回以内	2回以内		
はなっこりー				収穫前日まで	3回以内	3回以内		
ピーマン					収穫7日前まで	5回以内	5回以内	
ねぎ						5回以内 (種いも浸漬は 1回以内)		
たまねぎ				1000倍	1000倍		1000倍	5回以内
ばれいしょ		30～100倍		種いも1㎡当り 150ml/㎡		収穫14日前まで		1回
こんにゃく	腐敗病							
レタス	軟腐病 腐敗病 斑点細菌病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
非結球レタス	軟腐病 腐敗病			収穫14日前まで				
トレビス	萎凋細菌病			収穫3日前まで				
エンダイブ	軟腐病			1000倍			300L/10a	収穫14日前まで
セルリー		2回以内	2回以内					
パセリ					収穫7日前まで	3回以内		3回以内
チンゲンサイ		2000倍	100～ 500L/10a	100～ 500L/10a		収穫前日まで	2回以内	2回以内
らっきょう					1000倍	300L/10a	300L/10a	収穫7日前まで
さんとうさい		300L/10a	300L/10a	300L/10a				2回以内
アスパラガス								
ズッキーニ	軟腐細菌病	1000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内		
にんじん	軟腐病 斑点細菌病			収穫前日まで				
未成熟とうもろこし	褐色腐敗病							
茶	赤焼病	200～ 400L/10a	200～ 400L/10a	摘採7日前まで	2回以内	2回以内		
きく	斑点細菌病			—	5回以内	5回以内		
カラー	軟腐病	30倍	球根100Kg当り 1～3L	定植前	1回	球根吹き付け 処理	1回	
たばこ	空洞病	1000～1500倍	25～180L/10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内	