デランフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数（倍）	10a当り使用液量（L）	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジチアノンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	黒点病	1000～1500	200～700	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
		20	10			無人航空機による散布	
	そうか病						
		1000	200～700			散布	
	炭疽病（さび果）						
りんご	輪紋病 モニリア病 斑点落葉病 黒星病 炭疽病 黒点病 褐斑病 すす斑病 すす点病	1000～2000		収穫60日前まで			
かき	炭疽病 落葉病 うどんこ病	2000		収穫90日前まで	5回以内		5回以内
もも	灰星病 ホモプシス腐敗病	600		収穫7日前まで	4回以内		4回以内
	せん孔細菌病 黒星病	600～1000					
	縮葉病	1000					
ネクタリン	灰星病 ホモプシス腐敗病	600		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
	せん孔細菌病 黒星病	600～1000					
	縮葉病	1000					
うめ	黒星病 すす斑病	1500～2000					
		40～50	10			無人航空機による散布	
なし	黒星病 黒斑病 輪紋病 赤星病 疫病 炭疽病 黒斑細菌病、 心腐れ症(胴枯病菌) 褐色斑点病	1000	200～700	収穫60日前まで	4回以内	散布	5回以内
ぶどう	枝膨病 べと病 黒とう病 晩腐病			落弁期まで（但し、収穫75日前まで）	2回以内		3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内)
	黒とう病 晩腐病 つる割病	200		休眠期	1回		
いちじく	そうか病	1000		収獲75日前まで	3回以内		3回以内
おうとう	褐色せん孔病			収獲終了後～落葉期まで			
いちご	炭疽病		100～300	育苗期	2回以内		2回以内
せんりょう			200～300	発病初期	3回以内		3回以内