

ドイツボルドー A

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 L/10a	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	
稲	墨黒穂病 稲こうじ病	2000	60～150	出穂10日前まで	—	散布	
かんきつ	そうか病 黒点病	400～800	200～700	—			
	かいよう病	1000～2000		休眠期～蕾出現前			
キウイフルーツ	花腐細菌病	1000					500
	かいよう病	500					
くり	実炭疽病	500	100～300	—			
野菜類	軟腐病 べと病	500～1000					
トマト ミニトマト	疫病 斑点病 葉かび病	500					
きゅうり	斑点細菌病	500～1000					
レタス 非結球レタス	斑点細菌病 腐敗病						
メロン	斑点細菌病						
たまねぎ	白色疫病	500					根株養成期
うど	黒斑病						
アスパラガス	茎枯病						
キャベツ	黒腐病 黒腐細菌病	100～300					—
ばれいしょ	疫病		400～800				
かんしょ	斑点病		500				
いんげんまめ	かさ枯病		500～600				
はっか	さび病		500				
とうがん	果実汚斑細菌病		800				
てんさい	褐斑病		400～800				
ホップ	べと病		1000	100～700			
茶	炭疽病 もち病 網もち病		500	200～400	摘採14日前まで		
	赤焼病		500～1000				
ひまわり(種子)	空洞病	500	100～300	収穫14日前まで			
ひまわり				—			
樹木類	斑点症(シュードサーコスポラ菌)	800	200～700	発病初期			