

フロンサイド SC

作物名	適用病害名	希釈倍数又は使用量 (ml/10a)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数				
やまのいも	褐色腐敗病	500	100~200	植付前	1回	全面散布 土壌混和	5回以内 (植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内)				
キャベツ	苗立枯病 (リゾクトニア菌) 菌核病 根こぶ病			は種又は 定植前	2回以内 (苗床では1回以内、 本圃では1回以内)	全面散布 土壌混和	3回以内 (苗床では1回以内、 本圃での土壌混和は1回以内、 土壌散布は1回以内)				
	苗立枯病 (リゾクトニア菌)							定植前	1回	全面土壌散布	
	菌核病										
	株腐病										
ブロッコリー カリフラワー	根こぶ病		100~200	100~200	定植前	1回	全面散布 土壌混和	1回			
はくさい	根こぶ病						全面土壌散布	2回以内(土壌混和は1回以内、 土壌散布は1回以内)			
	尻腐病 軟腐病										
レタス 非結球レタス	ビッグベイン病						全面散布 土壌混和	2回以内(土壌混和は1回以内、 土壌散布は1回以内)			
	すそ枯病										
	軟腐病										
かぶ	根こぶ病	は種前					全面散布 土壌混和	1回			
だいこん	亀裂褐変症 (リゾクトニア菌)										
ばれいしょ	粉状そうか病	400~600					20	植付前	1回	植溝散布	6回以内 (種いも浸漬は1回以内、 植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、 植付後散布は4回以内)
	そうか病	200						植付時			
かんしょ	基腐病	500	50~200	植付前	1回	全面散布 土壌混和	3回以内 (植付前は1回以内、 植付後は2回以内)				
						全面土壌散布					
小麦	縞萎縮病	600	100	播種前	全面散布 土壌混和	3回以内(は種前は1回以内、 は種後は2回以内)					
	なまぐさ黒穂病	500									
チューリップ	微斑モザイク病 条斑病	500	100~200	植付前		7回以内					