

フロンサイド SC

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
かんきつ	そうか病 灰色かび病	2000~2500	200~700L /10a	収穫30日前まで	1回	散布	1回
	黒点病 ミカンハダニ ミカンサビダニ チャノホコリダニ	2000					
キウイフルーツ	白紋羽病	500	100L/樹	200~700L /10a	1回	土壌灌注	
	灰色かび病 果実軟腐病	2000	200~700L /10a			散布	
キウイフルーツ (苗木)	白紋羽病	500	—	植付時	1回	1時間苗木浸漬	
もも	灰星病 ホモブシス腐敗病	2000	200~700L /10a	収穫7日前まで	1回	散布	2回以内 (散布は1回以内、土壌灌注は1回以内)
	白紋羽病	500	50~100L/樹	収穫30日前まで		土壌灌注	
うめ	黒星病 灰色かび病	2000	200~700L /10a	発芽期まで 但し、収穫60日前まで	1回	散布	
				収穫後から 開花前まで 但し、収穫60日前まで		土壌灌注	
小粒核果類 (うめを除く)	500	50~100L/樹	収穫30日前まで	1回			
おうとう いちじく			収穫21日前まで				
ブルーベリー			収穫30日前まで				
ネクタリン			1000		100~200L/樹		
かき	落葉病 黒星落葉病 炭疽病 灰色かび病	2000	200~700L /10a	収穫45日前まで	1回	散布	2回以内 (散布は1回以内、土壌灌注は1回以内)
りんご	斑点落葉病 黒星病 褐斑病 すす点病 すす斑病	2000~2500					
	輪紋病 モニリア病	2000					
りんご	白紋羽病 紫紋羽病	500	50~100L/樹	100~200L/樹	1回	土壌灌注	
		1000	100~200L/樹				
りんご (苗木)	白紋羽病 紫紋羽病	500	—	植付時	1回	20分間 苗木浸漬	2回以内 (苗木浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内)
			25~50L/樹	植付後但し、 収穫開始 1年前まで		土壌灌注	
なし	黒斑病 黒星病	2000~2500	200~700L /10a	収穫30日前まで	1回	散布	2回以内 (散布は1回以内、土壌灌注は1回以内)
	輪紋病	2000					
	白紋羽病	500	50~100L/樹				
1000		100~200L/樹					
ぶどう	晩腐病 べと病 黒とう病 枝膨病 灰色かび病	2000	200~700L /10a	開花直前~ 落弁期 但し、収穫 60日前まで	1回	散布	2回以内 (散布は1回以内、土壌灌注は1回以内)
	白紋羽病	500	50~100L/樹	収穫21日前まで		土壌灌注	
		1000	100~200L/樹				
びわ	灰斑病	2000	200~700L /10a	収穫7日前まで	1回	散布	2回以内 (散布は1回以内、土壌灌注は1回以内)
	白紋羽病	500	50~100L/樹	収穫後から 開花前まで		土壌灌注	
		1000	100~200L/樹				
小麦	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病 なまぐさ黒穂病	1000	60~150L /10a	根雪前	2回以内	散布	3回以内 (は種前は1回以内、は種後は2回以内)
	雪腐小粒菌核病	1000~2000					
		250	25L/10a				
ばれいしょ	疫病	500	25L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	6回以内 (種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)
	菌核病	1000~2000	100~300L /10a				
	夏疫病	2000					
	そうか病	100	—				
かんしょ	基腐病	1000	100~300L /10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	3回以内 (植付前は1回以内、植付後は2回以内)
やまのいも	葉渋病	2000		収穫7日前まで	4回以内	散布	5回以内 (植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内)
あずき	菌核病	1000		収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
いんげんまめ	炭疽病 灰色かび病	1000~2000	収穫7日前まで				
	菌核病						
べにばないんげん	灰色かび病	1000	収穫14日前まで	6回以内	球根瞬間浸漬	8回以内 (球根瞬間浸漬 は2回以内、散布 は6回以内)	
ごぼう	黒条病		収穫21日前まで				
食用ゆり	葉枯病	50	—	植付前	2回以内	球根瞬間浸漬	
	鱗茎さび症			定植直前	1回	5分間苗木根部浸漬	
たまねぎ	乾腐病	1000~2000	100~300L /10a	収穫3日前まで	5回以内	散布	7回以内 (全面土壌混和 は1回以内、苗木根部浸漬は1回以内、散布は5回以内)
	灰色腐敗病 べと病						
	灰色かび病						
てんさい	白色疫病	1000	100~300L /10a	収穫30日前まで	4回以内	株元散布	5回以内(は種前の土壌混和及び苗木根部浸漬は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内)
	褐斑病	1000					
	根腐病	1000~2000					
てんさい	黒根病	100	3L/m ²	移植前	1回	苗木土壌灌注	
	炭疽病	1000	50ml/株	育苗期	1回	灌注	1回
アスパラガス (露地栽培)	茎枯病 斑点病	2000	100~300	収穫終了後 但し、秋期まで	5回以内	散布	5回以内
茶	灰色かび病 もち病 網もち病 炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 (輪斑病菌による) 褐色円星病 チャノホコリダニ	2000	200~400L /10a	摘採14日前まで	1回	散布	1回
ゆり	茎腐症 (リゾープ菌による)	500	3L/m ²	定植後	2回以内	土壌灌注	3回以内
うるし	白紋羽病		20~50L/樹	発病前	1回	散布	1回