フロンサイド粉剤

作物名	適用病害名	使用量（kg/10a）	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	そうか病 粉状そうか病	30～40	植付前	1回	全面土壌混和	6回以内i （種いも浸漬は 1回以内、植付前の 土壌混和及び植付時の 植溝散布は 合計1回以内、 植付後の散布は 4回以内）
かんしょ	基腐病	40				3回以内 （植付前は1回以内、 植付後は2回以内）
キャベツ	根こぶ病	15～20	は種 又は定植前	2回以内 （但し、苗床では 1回以内、 本圃では 1回以内）	作条土壌混和	3回以内 （苗床では1回以内 本圃での 土壌混和は1回以内、 土壌散布は 1回以内）
		30～40			全面土壌混和	
	苗立枯病 （リゾクトニア菌） 菌核病	40				
はくさい	根こぶ病	15～20		1回	作条土壌混和	2回以内 （土壌 混和は 1回以内、 土壌散布は 1回以内）
	黄化病	30～40			全面土壌混和	
カリフラワー ブロッコリー	根こぶ病	15～20			作条土壌混和	1回
		30～40			全面土壌混和	
のざわな		30～40				
		20			作条土壌混和	
メキャベツ かぶ		30～40			全面土壌混和	
こまつな	根こぶ病 立枯病 （リゾクトニア菌）	30	は種前			
みずな						
非結球あぶらな科 葉菜類 （ケール、こまつな、 みずな、のざわな、 なばな類を除く）	根こぶ病	30～40	は種 又は定植前			5回以内 （は種前の土壌混和 及び 苗床灌注は 合計1回以内、株元散布 及び散布は合計4回以 内）
なばな類		15～20			作条土壌混和	
		30～40			全面土壌混和	
		40			作条散布	
レタス 非結球レタス	すそ枯病 ビッグベイン病	30			全面土壌混和	2回以内 （土壌混和は1回以内、 土壌散布は 1回以内）
ね　ぎ	小菌核腐敗病 白絹病	15	土寄せ時、但し、収穫21日前まで	2回以内	株元散布	2回以内
たまねぎ	黒腐菌核病 紅色根腐病	40	定植前	1回	全面土壌混和	7回以内 （全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回 以内、散布は5回以内）
に ら	白絹病	20	収穫30日前まで	1回	株元散布	1回
てんさい	叢根病	育苗培土1kg当り 5～10g	は種前		土壌混和	5回以内 （は種前の土壌混和 及び 苗床灌注は 合計1回以内、株元散布 及び散布は合計4回以 内）
らっかせい	白絹病	20	収穫45日前まで		株元散布	1回
だいこん	亀裂褐変症 （リゾクトニア菌）	30～40	は種前		全面土壌混和	
チューリップ	葉腐病		植付前			7回以内
	条斑病 微斑モザイク病	40				
ゆり	茎腐症 （リゾ-プスス菌による）	40	定植前			3回以内