

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	イミノクタジンを含む 農薬の総使用回数	使用方法						
麦類 (小麦を除く)	雪腐大粒菌核病	1000	60～150L/10a	根雪前	2回以内	3回以内 (種子への処理は 1回以内、 散布は2回以内、 出穂期以降は1回以内)	散布						
	紅色雪腐病	10	乾燥種子1kg当り 30～50ml	は種前	1回			塗沫処理					
		5	乾燥種子1kg当り 15～25ml					種子吹き付け処理 又は塗沫処理					
		原液	乾燥種子1kg当り 3～5ml					10～30分間 種子浸漬					
	斑葉病	250～500	—										
	なまぐさ黒穂病	1000～2000	—										
	小麦	紅色雪腐病	250								25L/10a	根雪前	3回以内 (但し出穂期以 降は1回以内)
雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病		1000	60～150L/10a			収穫14日前まで							
うどんこ病 葉枯症													
赤かび病		1000～2000		は種前	1回								
紅色雪腐病		10	乾燥種子1kg当り 30～50ml								塗沫処理		
		5	乾燥種子1kg当り 15～25ml										
条斑病 ふ枯病		原液	乾燥種子1kg当り 3～5ml					種子吹き付け処理 又は塗沫処理					
なまぐさ黒穂病		1000～2000	—	10～30分間 種子浸漬									
りんご		紫紋羽病	250	200～700L/10a	苗木植付前	—	8回以内 (液剤及び水和剤は 合計6回以内 (開花期以降は 3回以内)、 塗布剤は2回以内)	根部浸漬					
		モニリア病 腐らん病 黒星病	1000		展葉期	6回以内 (但し開花期 以降散布は 3回以内)							
	腐らん病	500～1000	休眠期										
	黒星病	1500	収穫前日まで										
	斑点落葉病 褐斑病 輪紋病 すす点病 すす斑病	1500～2000	200～700L/10a		休眠期	1回		3回以内 (休眠期は1回以内、 生育期は2回以内)					
晩腐病	250～500												
褐斑病 黒とう病 つる割病	250												
黒とう病 枝膨病	1000												
なし	黒斑病	250		休眠期			1回			5回以内 (塗布剤は2回以内、 液剤は1回以内)			
	黒星病	1000	収穫後～休眠期										
もも	縮葉病	250～500	200～700L/10a	休眠期	1回	3回以内 (休眠期は1回以内)							
みかん	貯蔵病害 (青かび病、緑かび病)	2000～3000	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	散布						
	貯蔵病害 (黒腐病、白かび病、 すす斑病)	2000											
かんきつ (みかん、 ゆずを除く)	貯蔵病害 (青かび病、緑かび病)	2000～3000			2回以内	2回以内							
	貯蔵病害 (黒腐病、白かび病、 すす斑病)	2000											
ゆず	貯蔵病害 (青かび病、緑かび病)	2000～3000			2回以内	2回以内							
	貯蔵病害 (黒腐病、白かび病、 すす斑病) 幹腐病	2000											
マルメロ かりん	腐らん病	1500			200～700L/10a	展葉期		4回以内(但し 開花期以降 散布は3回以内)	4回以内 (開花期以降 は3回以内)				
アスパラガス	茎枯病	1000			100～300L/10a	収穫終了後 (冬期まで)		5回以内	5回以内				
りんどう	花腐菌核病 葉枯病	1500			100～700L/10a	—		8回以内	8回以内				