

ベルコート水和剤

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	散布液量(L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	使用方法		
りんご	黒星病 斑点落葉病	1000~2000	200~700	収穫前日まで	6回以内 (但し開花期以降散布は3回以内)	8回以内 (液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内)	散布		
	輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病 黒点病	1000							
なし	黒斑病 黒星病 輪紋病 うどんこ病	1000~1500		収穫14日前まで	5回以内	5回以内 (塗布剤は2回以内、液剤は1回以内)			
もも	黒星病	2000		収穫前日まで	3回以内	3回以内 (休眠期は1回以内)			
	灰星病 ホモブシス腐敗病 うどんこ病 すすかび病 果実赤点病	1000~2000							
おうとう	灰星病	1000		収穫7日前まで	3回以内	3回以内			
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	黒星病 灰星病 すす斑病 環紋葉枯病 灰色かび病	2000		収穫30日前まで					
								うめ	枝枯病
びわ	灰斑病 灰色かび病	1000		収穫7日前まで					
すもも	灰星病	1000~2000		収穫3日前まで					
みかん	そうか病	1000	収穫前日まで	2回以内	2回以内				
かんきつ (みかんを除く)	灰色かび病	2000							
かき	炭疽病 落葉病 うどんこ病 灰色かび病 すす点病 黒星病	1000~1500	収穫14日前まで	3回以内	3回以内				
						キウイフルーツ	果実軟腐病 灰色かび病 貯蔵病害 (灰色かび病)	1000	
マンゴー	炭疽病	3000	収穫14日前まで	2回以内	2回以内				
あけび(果実)	うどんこ病		収穫14日前まで	4回以内	4回以内				
かぼちゃ	うどんこ病		1000~2000						
ズッキーニ		2000	収穫7日前まで	7回以内	7回以内				
すいか	菌核病 炭疽病	1000	収穫前日まで	4回以内	4回以内				
						うどんこ病 つる枯病			
メロン			収穫前日まで	5回以内	5回以内				
きゅうり	褐斑病	2000	100~300	収穫前日まで	7回以内	7回以内			
	うどんこ病 灰色かび病 炭疽病	2000~4000							
うり類 (漬物用)	炭疽病 うどんこ病 つる枯病		収穫3日前まで	5回以内	5回以内				
なす	すすかび病 灰色かび病 うどんこ病	3000	100~500	収穫前日まで	3回以内	3回以内			
トマト	灰色かび病 葉かび病	3000~6000							
ミニトマト		6000	収穫前日まで	2回以内	2回以内				
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	1000	100~300	収穫前日まで	5回以内	5回以内			
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病						100~500		
にんじん	菌核病	500~1000	乾燥種子重量の0.5%	収穫14日前まで	1回	5回以内 (種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内)	種子粉衣		
	黒葉枯病	—		は種前					
ねぎ	葉枯病 さび病 黒斑病	2000	100~300	収穫30日前まで	3回以内	3回以内	散布		
にんにく	葉枯病	1000~1500		収穫3日前まで					
キャベツ	菌核病	1000		収穫14日前まで					
レタス	灰色かび病 菌核病	1000~2000		育苗期 (定植前)	5回以内	10回以内 (育苗期は5回以内、本圃では5回以内)			
いちご	炭疽病	1000						収穫前日まで (生育期)	
	うどんこ病	4000							
ばれいしょ	夏疫病	500		1000~2000	収穫7日前まで	5回以内		5回以内 (種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内)	種いも粉衣
やまのいも	葉渋病				5回以内				
		青かび病		—	種いも重量の1%	植付前		1回	
豆類 (種実、但しだいずを除く)	うどんこ病 炭疽病 褐斑病				収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 (輪斑病菌による)	1000	200~400	摘採7日前まで	2回以内	2回以内			
たばこ	赤星病 灰色かび病 うどんこ病	1000~2000	100~180	収穫10日前まで					
樹木類	炭疽病	1000	200~700	発病初期	3回以内	3回以内			