

ペンコゼブ水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10a当り 散布液量 (L)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	マンゼブを 含む農薬の 総使用回数
みかん	黒点病	400～800	200～700	収穫30日前まで	4回以内	散布	4回以内
	小黒点病	600～800					
	そうか病	400		収穫90日前まで			
	チャノキイロアザミウマ そばかす病 褐色腐敗病	400～600					
	ミカンサビダニ	1000					
	炭疽病	600					
かんきつ (みかんを除く)	チャノキイロアザミウマ 炭疽病 褐色腐敗病 そばかす病 汚れ果症						
黒点病 小黒点病	600～800						
ミカンサビダニ	1000						
かき	炭疽病 落葉病	400～800		収穫45日前まで	2回以内		2回以内
	うどんこ病	4000倍					
なし	黒星病 赤星病	400～600			5回以内		5回以内
	黒斑病 輪紋病	600					
りんご	黒星病 赤星病 黒点病 斑点落葉病 褐斑病 炭疽病 すす点病 すす斑病	500～600		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
	輪紋病	500					
	もも	黒星病 果実赤点病 せん孔細菌病		600	収穫21日前まで		
おうとう	灰星病	2回以内			2回以内		
ぶどう	さび病 黒とう病 べと病 晩腐病 さび病			1000			
	オリーブ						炭疽病
びわ	たてぼや病			落弁期まで			
マンゴー	炭疽病	800		収穫45日前まで			
すいか	炭疽病 つる枯病	400～600	100～300	収穫7日前まで	7回以内	7回以内	
	褐色腐敗病	600			5回以内	5回以内	
メロン	つる枯病 べと病	400～600		仮植栽培期但し 収穫76日前まで	6回以内	6回以内	
いちご	炭疽病	600		収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
にんじん	黒葉枯病	400		収穫前日まで	3回以内	3回以内	
きゅうり	べと病	600～800			600	2回以内	2回以内
	炭疽病 褐斑病 黒星病	600		3回以内		3回以内	
トマト	疫病 葉かび病	800		収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
キャベツ	べと病	400～600		収穫30日前まで	3回以内	3回以内	
はくさい		黒斑病 白斑病			1回	1回	
ねぎ	べと病 黒斑病 さび病	400～600		収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
たまねぎ	べと病 黒斑病 灰色かび病				5回以内	5回以内	
ばれいしょ	夏疫病		疫病	10回以内	10回以内(無人航空機散布は 3回以内)		
	疫病					2回以内	2回以内
さといも		500	100～300	収穫21日前まで	4回以内	4回以内	
やまのいも	炭疽病 葉渋病	400～600			2回以内	2回以内	
かぼちゃ	べと病 疫病	600			5回以内	5回以内	
てんさい	褐斑病	400～600	25				
		125					25
だいず	べと病 紫斑病	400	100～300	収穫45日前まで	3回以内	3回以内	
にんにく	葉枯病	400～600		収穫7日前まで	5回以内	5回以内	
さんしょう (果実)	さび病	600	200～700	最終収穫後から 落葉期まで	3回以内	3回以内	
アスパラガス (露地栽培)	斑点病 茎枯病	500	100～300	収穫終了後 但し、秋期まで	6回以内	6回以内	
	褐斑病						
樹木類	炭疽病 炭斑点症(シュードサーコ スポラ菌)	600	200～700	発病初期	4回以内	4回以内	
	枝枯細菌病						