

ホライズンドライブフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数	散布液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シモキサニル含む農薬の総使用回数	ファモキサドンを含む農薬の総使用回数	
ぶどう	べと病	2500～5000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内	
	晩腐病 黒とう病 褐斑病	2500倍							
トマト ミニトマト	疫病	1500～2500倍	150～300L/10a	収穫前日まで					
	葉かび病	2500倍							
なす	褐色腐敗病	2500倍							
きゅうり メロン	べと病	2500倍	100～300L/10a	収穫14日前まで					
はくさい		2500～5000倍							
	白さび病	2500倍							
ブロッコリー	べと病 黒すす病	2500倍		収穫前日まで					
たまねぎ	べと病 白色疫病	2500倍		収穫3日前まで					
すいか	褐色腐敗病	2500倍		収穫前日まで					
らっきょう	白色疫病	1000倍		収穫21日前まで					
ばれいしょ	夏疫病	1500倍		25L/10a	収穫14日前まで	4回以内	無人航空機 散布	4回以内	4回以内
	疫病	1000～2500倍							
		400倍							
		20倍							
	40倍	3.2L/10a							
だいず	べと病	2500倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内	