リゾレックス水和剤

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリクロホスメチ ルを含む農薬の総使用回数
りんご	紫紋羽病	1000倍	40L/樹	収穫60日前まで	1回	土壌灌注	1回
麦類	雪腐小粒菌核病	1000～1500倍	60～150 L/10a	根雪前	2回以内	散布	2回以内
てんさい	根腐病	100倍	ペーパーポット 1冊当り1L （3L/㎡）	定植前	1回	灌注	6回以内 （育苗土壌への混和は1回以内、500倍希釈灌注は1回以内、100倍希釈灌注は1回以内散布は3回以内）
	葉腐病	500～1000倍	100～300 L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	
	苗立枯病 （リゾクトニア菌）	500倍	3L/㎡	育苗中期	1回	土壌灌注	
ばれいしょ	黒あざ病	50～100倍	―	貯蔵前又は植付け前		種いも浸漬 （10分以内）	1回
にんじん	苗立枯病 （リゾクトニア菌）	1000倍	3L/㎡	は種時		全面土壌灌注	2回以内 （は種前は1回以内、は種後は1回以内）
	根腐病	500倍	300L/10a	収穫14日前まで		散布	
レタス	すそ枯病 白絹病	1000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
キャベツ	株腐病	500～1000倍					
はくさい	尻腐病	1000倍		収穫14日前まで			3回以内 （定植前の土壌混和は1回以内）
こまつな	リゾクトニア病				2回以内		3回以内 （は種前は1回以内、は種後は2回以内）
トマト きゅうり なす ほうれんそう	苗立枯病 （リゾクトニア菌）	500倍	3L/㎡	は種時	1回	土壌灌注	1回
		種子重量の 0.5%粉衣	―			種子粉衣	
ミニトマト		500倍	3L/㎡			土壌灌注	4回以内 （種子粉衣は1回以内、は種前の土壌混和及びは種時の土壌灌注は合計1回以内、株元灌注は2回以内）
ピーマン		種子重量の 0.5%粉衣	―			種子粉衣	
	白絹病	1000倍	1L/株	収穫前日まで	2回以内	株元灌注	
ししとう 甘長とうがらし			1L/㎡				2回以内
ぎぼうし				収穫90日前まで			
アスパラガス	茎枯病	500倍	100～300 L/10a	収穫後から茎葉刈取り期まで但し、収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	苗立枯病			株養成期（は種又は定植時から茎葉刈取り期まで）但し、収穫14日前まで			
メロン	黒点根腐病		3L/㎡	定植時	1回	株元灌注	2回以内 （定植時は1回以内、生育期は1回以内）
				生育期　但し、収穫21日前まで			
こんにゃく	白絹病	1000倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
だいず				収穫14日前まで		土壌灌注	
ふき				収穫21日前まで	1回	株元灌注	3回以内 （種茎粉衣は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内、株元灌注は1回以内）
にら					2回以内		2回以内
にら(花茎)				収穫前日まで			
ねぎ			100～300L/10a	土寄せ時但し、収穫14日前まで	3回以内	株元散布	3回以内
うど				収穫45日前まで	2回以内	散布	3回以内 （粉剤は1回以内、水和剤は2回以内）
はすいも（葉柄）	茎腐病			収穫7日前まで	3回以内		3回以内
メキャベツ	立枯症 （リゾクトニア菌）	500倍	3L/㎡	は種、仮植時及び定植時		土壌灌注	
オクラ	苗立枯病 （リゾクトニア菌）	1000倍	1L/㎡） 150ml/穴	は種時及び子葉展開時	2回以内	植穴土壌灌注	2回以内
ブロッコリー		500倍	3L/㎡	育苗期		土壌灌注	3回以内 （育苗期は2回以内、定植後は1回以内）
				収穫21日前まで	1回	株元灌注	
豆類（未成熟、ただし、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめを除く）		1000倍	1L/㎡	は種時		土壌灌注	1回
さやえんどう 実えんどう							3回以内 （種子粉衣は合計1回以内、は種時の土壌灌注は合計1回以内生育期の土壌灌注は2回以内（但し、は種時に土壌灌注する場合には1回以内））
	茎腐病			収穫7日前まで	2回以内		
		種子重量の 0.5%粉衣	―	は種時	1回	種子粉衣	
未成熟そらまめ	苗立枯病 （リゾクトニア菌）	1000倍	1L/㎡			土壌灌注	2回以内 （は種時は1回以内）
	茎腐病			収穫前日まで	2回以内	株元灌注	
未成熟とうもろこし	紋枯病	1500倍	100～300L/10a	収穫14日前まで		散布	2回以内
みようが（花穂）	白絹病	2000倍	5L/㎡			土壌灌注	
みようが（茎葉）				みょうが（花穂）の収穫14日前まで、但し花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで			
ふだんそう	立枯病	500倍	3L/㎡	は種時但し収穫30日前まで	1回	株元灌注	1回
みつば			0．5L/㎡	収穫90日前まで	2回以内		2回以内 （は種前の土壌混和は1回以内）
みつば（水耕栽培）		1000倍	100～300L/10a	育苗期但し収穫40日前まで	1回		1回
みずな	リゾクトニア病		3L/㎡	は種時		土壌灌注	5回以内
花き類・観葉植物	立枯病 株腐病 茎腐病	500～1000倍		生育期	5回以内		
	白絹病			―		株元灌注	
スイトピー	腰折病			生育期		土壌灌注	
カーネーション	根腐病 苗立枯病 （リゾクトニア菌）						
アスター	苗立枯病 （リゾクトニア菌）						
チューリップ	葉腐病	100倍	100L/10a	植付前	1回	全面散布土壌混和	
		200倍	200L/10a	植付後～萌芽前	5回以内	全面土壌散布	
ハイドランジア	葉腐病	500～1000倍	100～300L/10a	生育期		散布	
えぞまつ（苗木） とどまつ（苗木）	苗立枯病 （リゾクトニア菌）	1000倍	3L/㎡	発芽後（発病初期）		苗木兼全面土壌散布	
樹木類	くもの巣病		200～700L/10a	発病初期		散布	
	白絹病		3L/㎡			株元灌注	