

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数	使用方法	
りんご	腐らん病 輪紋病	原液	剪定時及び病患部 削り取り直後	3回以内	10回以内 (塗布は3回以内、 灌注は1回以内、 散布は6回以内)	塗布	
	切り口及び傷口の ゆ合促進		剪定整枝時、病患部 削り取り直後、及び 病枝切除後				11回以内 (塗布は3回以内、 休眠期の散布は 1回以内、灌注は 1回以内、生育期の 散布は6回以内)
マルメロ かりん			切り口及び傷口の ゆ合促進		剪定整枝時、病患部 削り取り直後、及び 病枝切除後		
	もも						10回以内 (塗布は3回以内、 休眠期の散布は 1回以内、生育期の 散布は6回以内)
							おうとう
	小粒核果類						すももは6回以内 (塗布は3回以内、 休眠期の散布は 1回以内、生育期の 散布は3回以内)、 その他の 小粒核果類は6回以内 (塗布は3回以内、 散布は3回以内)
							かき
	くり						切り口の枯込防止
胴枯病			病患部削り取り直後				
いちじく	切り口及び傷口の ゆ合促進		剪定整枝時、病患部 削り取り直後、及び 病枝切除後		14回以内 (塗布は3回以内、 灌注は6回以内、 散布は5回以内)		
		かんきつ		8回以内 (塗布は3回以内、 散布、空中散布 及び無人航空機散布 は合計5回以内)			
キウイフルーツ	切り口及び傷口の ゆ合促進	剪定整枝時、病患部 削り取り直後、及び 病枝切除後	8回以内 (塗布は3回以内、 散布は5回以内)				
びわ			7回以内 (塗布は3回以内、 散布は3回以内 灌注は1回以内)				
ぶどう			5回以内 (塗布は3回以内、 休眠期の散布は1回以内、 生育期の散布は1回以内)				
オリーブ	切り口及び傷口の ゆ合促進	剪定整枝時、病患部 削り取り直後、及び 病枝切除後	5回以内 (塗布は3回以内、 散布は2回以内)				
オリーブ(葉) 果樹類 (もも、りんご、なし、かき、 マルメロ、かりん、いちじく、 かんきつ、おうとう、 小粒核果類、びわ、 キウイフルーツ、ぶどう、 くり、オリーブを除く)			3回以内				
樹木類			5回以内				
きゅうり すいか 漬物用すいか まくわうり	つる枯病	原液	発病初期	5回以内	6回以内(種子への 処理は1回以内、 は種後は5回以内)		
メロン			発病初期 但し、収穫21日 前まで	1回	5回以内(種子への 処理は1回以内、 塗布は1回以内、 散布は3回以内)		
さくら	てんぐ巣病	原液	病枝切除後	5回以内	5回以内		
きり	腐らん病		剪定整枝時及び 病患部削り取り直後				
ぶな (伐倒木)	クワイカビ類による 木材腐朽		伐倒直後	1回	木口に 塗布		