

カンタスドライフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	散布液量 (10a当り)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ポスカリドを含む 農薬の総使用 回数	
かんきつ	灰色かび病	1500	200～700L	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	
大粒種ぶどう	灰色かび病 すす点病	1000～1500		収穫7日前まで				
小麦	眼紋病 うどんこ病	1500	60～150L	収穫45日前まで	2回以内		2回以内	
いちご	灰色かび病	1000～1500	100～300L	収穫前日まで	3回以内		3回以内	
トマト ミニトマト	灰色かび 病菌核病 葉かび病							
なす	灰色かび病 菌核病 すすかび病							
きゅうり	灰色かび病 菌核病							
	褐斑病	1500						
メロン すいか	菌核病	1000～1500						収穫14日前まで
にんじん	黒葉枯病 斑点病							
レタス	灰色かび病 菌核病			収穫7日前まで				
非結球レタス				収穫14日前まで				
くきちしゃ	菌核病	1500		収穫7日前まで	1回		1回	
エンダイブ					2回以内		1回	
トレビス								
キャベツ	菌核病 株腐病 黒斑病	1500		収穫前日まで	3回以内		4回以内(定植前 は1回以内、定植 後は3回以内)	
なばな類	菌核病							
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病	1000～1500		収穫前日まで	3回以内		3回以内	
	小菌核病	1500						
豆類(種実、た だし、らっかせい、あ ずき、いんげんま めを除く)	菌核病	1500		収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
あずき	灰色かび病 菌核病	1000～1500						
	さび病	1500		収穫21日前まで	2回以内		2回以内	
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病	1000～1500						3回以内
さやいんげん								
未成熟そらまめ	赤色斑点 病さび病	1000		収穫前日まで	2回以内		2回以内	
さやえんどう 実えんどう	灰色かび病							
ブロッコリー	菌核病	1500		収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
らっきょう	灰色かび病							
ピーマン	灰色かび病 黒枯病	1000～1500		収穫前日まで	2回以内		2回以内	
とうがらし類								
食用ぎく	灰色かび病	1000		収穫7日前まで	3回以内		2回以内	
プンタレッツラ		1500						収穫3日前まで