Ｚボルドー

作物名	適用病害名	希釈倍数（倍）	使用液量（L/10a）	使用時期	本剤及び銅を含む農薬の総使用回数	使用方法
麦類	黒節病	種子重量の1%	—	は種前	—	湿粉衣
大麦 採種用小麦		500	60～150	—		散布
かんきつ	そうか病	400～500	200～700			
	黄斑病	600				
	かいよう病	500～1000				
りんご	すす点病 すす斑病	500				
すもも	黒斑病			休眠期		
ネクタリン	せん孔細菌病					
もも				収穫後～開花前まで		
ぶどう	べと病 さび病 褐斑病	500～800		—		
	つる割細菌病	800				
おうとう	せん孔細菌病	500				
うめ	かいよう病			葉芽発芽前まで		
びわ	がんしゅ病			—		
いちじく	疫病	1000				
キウイフルーツ	花腐細菌病	500		休眠期～叢生期 （新梢長約10cmまで）		
かんしょ	斑点病 基腐病		100～300	—		
ばれいしょ	軟腐病					
	疫病	400				
やまのいも	葉渋病 炭疽病	500				
だいず	紫斑病 斑点細菌病 葉焼病					
あずき	褐斑細菌病					
いんげんまめ	かさ枯病					
さやえんどう 実えんどう	先端黄白化症	1000				
そらまめ 未成熟そらまめ	赤色斑点病	500				
すいか	疫病	500～800				
トマト ミニトマト	疫病 輪紋病	400～600				
	すすかび病	500				
なす						
だいこん	軟腐病	16	1.6～3.2			無人航空機による散布
	黒斑細菌病	16	3.2			
	白さび病					
		500	100～300			散布
にら	株腐細菌病 白斑葉枯病					
にんにく	さび病 春腐病 白斑葉枯病					
にんじん	軟腐病	16	1.6～3.2			無人航空機による散布
	黒葉枯病		3.2			
		500～800	100～300			散布
レタス 非結球レタス	軟腐病	16	1.6～3.2			無人航空機による散布
	腐敗病	500～800	100～300			散布
パセリ	軟腐病	800				
ブロッコリー	花蕾腐敗病	500				
	黒腐病	16	8			無人航空機による散布
			3.2			
キャベツ	軟腐病 黒腐病	16	1.6～3.2			
		500～1000	100～300			散布
	斑点細菌病 べと病 黒斑細菌病	500				
アスパラガス	斑点病	500				散布
	茎枯病					
		8	8L			無人航空機による散布
くわい	ひぶくれ病	500	100～300			散布
こんにゃく	葉枯病 腐敗病	500～800				
茶	炭疽病	400	200～400	摘採7日前まで		
	赤焼病	500				
	もち病 網もち病	400～500				
てんさい	褐斑病	400	100～300	—		
野菜類 （キャベツを除く）	斑点細菌病 褐斑細菌病 黒腐病 軟腐病 べと病 黒斑細菌病	500				
さんしょう（果実）	さび病	1000	200～700			
さんしょう（葉）			100～300			
にがうり	うどんこ病	500				
かぼちゃ	果実斑点細菌病 軟腐細菌病					
ズッキーニ	軟腐細菌病					
りんどう	葉枯病					
つつじ類	もち病		100～700			
樹木類	斑点症 （シュードサーコスポラ菌）	800		発病初期		
	輪紋葉枯病	500				