

ライメイフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	10a当り 散布液量 (L)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アミスルプロムを 含む農薬の 総使用回数
ぶどう	べと病	3000~4000	200~700	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
いちじく	疫病	3000		収穫前日まで			
かんきつ	褐色腐敗病						
ばれいしょ	疫病	25	1.6	収穫7日前まで	4回以内	無人航空機 による散布	5回以内(植付前は 1回 以内、植付後 は4回以内)
		50	3.2				
		500	25				
		2000~3000					
だいず	べと病	2000	100~300	収穫3日前まで	3回以内	4回以内(種子への処理は 1回以内、散布は3回以内)	
あずき	茎疫病	2000~4000					
		2000					
えだまめ	べと病	2000~4000					
レタス 非結球レタス		2000					
キャベツ	べと病	2000~3000		収穫7日前まで	4回以内	8回以内(苗床での土壌混 和は2回以内、灌注は1回 以内、本圃での土壌混和 は2回以内、散布は4回以 内)	
はくさい	白さび病	2000~4000					
カリフラワー	べと病	2000		収穫7日前まで	4回以内	7回以内(土壌混和は 2回以内、灌注は1回 以内、散布は4回以内)	
ブロッコリー		2000~3000					
だいこん	ワッカ症	2000~4000		100~300	収穫3日前まで	3回以内	4回以内
かぶ	白さび病						
非結球あぶ らな科葉菜類			べと病		収穫7日前まで	2回以内	2回以内
ほうれんそう	疫病						
ピーマン			褐色腐敗病		3回以内		
なす	疫病					4回以内	
トマト ミニトマト			べと病		4回以内		
きゅうり メロン	褐色腐敗病					4回以内	
すいか			疫病 べと病		2000		
かぼちゃ	白色疫病					2000	
らっきょう		疫病	2000~4000				
とうがらし類	収穫3日前まで			3回以内	3回以内		
	収穫前日まで						