

アフェットフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数	
小粒核果類 もも ネクタリン	灰星病 黒星病	2000倍	200～ 700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
おうとう	灰星病 幼果菌核病							
なし	黒星病 赤星病 うどんこ病							
りんご	黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 褐斑病 モニリア病 黒点病 すす点病 すす斑病							
かんきつ	灰色かび病 そうか病							
かき	落葉病							
ぶどう	灰色かび病 晩腐病 黒とう病 うどんこ病 褐斑病 さび病							
キャベツ	灰色かび病 菌核病 株腐病 根朽病							
はくさい	黒斑病 白斑病 菌核病 尻腐病							
はなやさい類	菌核病 黒すす病 根朽病							
つるな	菌核病							
にら	白絹病	1000～2000倍	0.5～1L/㎡	収穫前日まで	2回以内	株元灌注	2回以内	
	黒腐菌核病							
にら(花茎)	白斑葉枯病 さび病 白絹病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
しそ	灰色かび病 斑点病							
しそ(花穂)								
セルリー	斑点病 菌核病							
しょうが	白星病							
にんじん	黒葉枯病 白絹病							
アスパラガス	茎枯病 褐斑病 斑点病							
きゅうり	灰色かび病 菌核病 うどんこ病							
メロン	つる枯病							2000～4000倍
	うどんこ病							
すいか	菌核病 つる枯病 うどんこ病							
かぼちゃ	うどんこ病 つる枯病							
ズッキーニ にがうり	うどんこ病							
ししとう	灰色かび病 うどんこ病 黒枯病 斑点病							
いちご	灰色かび病 うどんこ病 輪班病							
オクラ	灰色かび病 うどんこ病							
トマト	灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病	2000～4000倍	1L/株	収穫前日まで	3回以内	株元灌注	3回以内	
	うどんこ病							
ミニトマト	灰色かび病 菌核病 斑点病 葉かび病 すすかび病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	うどんこ病							
ピーマン	灰色かび病 黒枯病 斑点病	2000～4000倍	1L/株	収穫前日まで	3回以内	株元灌注	3回以内	
	白絹病							
なす	灰色かび病 菌核病 すすかび病 うどんこ病 褐色斑点病 褐色円星病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	うどんこ病							
ねぎ	白絹病 黒腐菌核病	1000～2000倍	1L/㎡	生育期 但し、 収穫14日前まで	2回以内	株元灌注	4回以内 (株元灌注は2回 以内、 散布及び無人航 空機散布は合 計2回以内)	
	さび病 黒斑病 小菌核腐敗病 小菌核病 白絹病 葉枯病							
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	
にんにく	さび病 葉枯病							
エンダイブ	黒腐菌核病	原液	種球重量の 0.5～1.0%	植付前	1回	種球塗沫	4回以内(種球塗 沫は1回以内、 散布は3回以内)	
	さび病 葉枯病							
エンダイブ	すす枯病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内	
レタス 非結球レタス	すす枯病 灰色かび病 菌核病 白絹病							
パセリ	うどんこ病							
食用ぎく	灰色かび病 うどんこ病 白さび病							
食用さくら(葉)	うどんこ病 せん孔褐斑病							
豆類 (未成熟、ただし、え だまめを除く)	灰色かび病 菌核病 さび病							
豆類 (種実、ただし、らっ かせいを除く)								
だいず えだまめ	灰色かび病 菌核病 さび病 うどんこ病							
らっかせい	白絹病 灰色かび病 菌核病 さび病 褐斑病							
小麦	赤さび病							
てんさい	根腐病	200～400倍	ペーパーポッ ト1冊当り1L (3L/㎡)	移植前	1回	苗床灌注	4回以内(苗床 灌注は1回以 内、散布は3回 以内)	
	葉腐病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前ま で	3回以内	散布	2回以内	
未成熟とうもろこし	紋枯病				2回以内		2回以内	
とうき	苗立枯病	500～1000倍	セル成形育苗 トレイ1箱また はペーパー ポット1冊 (30x60cm・使 用土壌1.5～ 4.0L)当り0.2L	育苗期	5回以内	灌注	5回以内	
とりかぶと(薬用)	白絹病	1000倍	1L/㎡	生育期	3回以内	株元灌注	3回以内	
たばこ	菌核病	2000倍	100～ 180L/10a	収穫10日前ま で	2回以内		2回以内	
花き類・観葉植物(き く、ゆり、チューリップ 、りんどうを除く)	灰色かび病 うどんこ病	2000倍	100～ 300L/10a	発病初期	3回以内	散布	3回以内	
チューリップ	灰色かび病 うどんこ病 褐色斑点病							
りんどう	灰色かび病 うどんこ病 花腐菌核病 黒斑病							
きく	灰色かび病 うどんこ病 白さび病							
ゆり	灰色かび病 うどんこ病 葉枯病							