

オラクル粉剤

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アミスルブロムを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	苗立枯病 (ピシウム菌)	育苗箱(30×60×3cm、使用 土壌約5L) 1箱当り10～15g	は種前	1回	育苗箱土壌に 均一に混和する	1回
かぶ	根こぶ病	30kg/10a	は種前又は 定植前	2回以内	全面土壌混和	5回以内(土壌混和は 2回以内、散布は 3回以内)
非結球 あぶらな科 葉菜類		20～30kg/10a				6回以内(土壌混和は 2回以内、 灌注は1回以内、 散布は3回以内)
茎ブロッコリー		30kg/10a	定植前			3回以内(土壌混和は 2回以内、灌注は 1回以内)
キャベツ		20kg/10a	は種前(苗床)			8回以内(苗床での 土壌混和は2回以内、 灌注は1回以内、 本圃での土壌混和は 2回以内、散布は 4回以内)
		30kg/10a	定植前		作条土壌混和	
ブロッコリー カリフラワー					20kg/10a	定植前
はくさい		30kg/10a	は種前又は 定植前		作条土壌混和	
		20kg/10a	定植前		全面土壌混和	
		ピシウム腐敗病			30kg/10a	全面土壌混和
ばれいしょ		粉状そうか病	20kg/10a		植付前	1回