

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	10a当り 散布液量 (L)	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ピラクロストロ ピンを含む農薬 の総使用回数	ボスカリドを 含む農薬の 総使用回数																
ねぎ	べと病 黒斑病 さび病	1500	100～300	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内																
たまねぎ	灰色腐敗病	500	100～300	定植直前	1回	5分間 苗根部 浸漬	4回以内(定植前 は1回以内、定植 後3回以内)	4回以内(定植前 は1回以内、定植 後3回以内)																
	灰色かび病 べと病 小菌核病 白色疫病	1500				5分間 セル苗 浸漬																		
キャベツ	菌核病 株腐病 黒斑病	1500～2000			100～300	収穫7日 前まで			2回以内	散布	2回以内	2回以内												
	べと病																							
はくさい	菌核病 炭疽病 尻腐病	1500							100～300		収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内									
	白斑病 黒斑病 べと病 白さび病	1500～2000																						
なす	灰色かび病 菌核病 うどんこ病 褐色斑点病	1500										100～300		収穫7日 前まで		3回以内	散布	3回以内	3回以内					
	すすかび病	1500～2000																						
トマト ミニトマト	葉かび病 灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 菌核病	2000														100～300		収穫前日 まで		2回以内	散布	2回以内	3回以内	
ピーマン	うどんこ病 炭疽病 黒枯病 灰色かび病 斑点病																							
とうがらし類	うどんこ病 炭疽病 黒枯病 灰色かび病 斑点病	1500～2000	100～300	収穫前日 まで			2回以内	散布												2回以内		2回以内		
すいか	炭疽病 うどんこ病 つる枯病																							
かぼちゃ	菌核病 褐色腐敗病	1500			100～300	収穫前日 まで	3回以内			散布										3回以内		3回以内		
	うどんこ病	1500～2000																						
にんじん	黒葉枯病 うどんこ病 斑点病	2000					100～300		収穫前日 まで		2回以内		散布		2回以内					3回以内				
にんにく	さび病 白斑葉枯病 黄斑病 葉枯病	1500																						
レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病	1500～2000									100～300	収穫前日 まで		2回以内	散布		2回以内		2回以内					
	べと病																							
非結球レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病	1500												100～300		収穫前日 まで	2回以内	散布			2回以内		2回以内	
	べと病	1500～2000																						
はなやさい類	菌核病 黒すす病	1500	100～300	収穫前日 まで				2回以内									散布				2回以内			2回以内
	べと病	1500～2000																						
いちご	灰色かび病	2000			100～300	収穫前日 まで		2回以内		散布											2回以内	3回以内		
	うどんこ病 炭疽病																							
バジル	べと病	2000					100～300	収穫前日 まで	2回以内				散布							2回以内				
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	1500																						
さやえんどう 実えんどう	灰色かび病 さび病	1500～2000							100～300		収穫前日 まで	2回以内			散布				2回以内		2回以内			
	うどんこ病																							
未成熟とうもろこし	すす紋病	2000										100～300		収穫前日 まで		2回以内		散布	2回以内					
収穫7日 前まで																								