NCS

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	くん蒸時間	使用時期	使用方法
まつ（伐倒木）	貯木場、林内空地	マツノマダラカミキリ幼虫 マツノザイセンチュウ	被覆内1㎥当り原液0.5L	14日以上	—	加害された伐倒木を配置し、直ちにビニール等で密閉し、くん蒸する。
			被覆内容積1㎥当り原液1.0L	7日以上		
いぬまき（伐倒木）		ケブトラカミキリ	被覆内容積1㎥当り原液0.5L	14日以上		
			被覆内容積1㎥当り原液1.0L	7日以上		
すぎ（伐倒木）		スギカミキリ	被覆内容積1㎥当り原液0.5～1.0L	14日以上		
うめ（伐倒木） さくら（伐倒木） すもも（伐倒木） もも（伐倒木）	—	クビアカツヤカミキリ幼虫	被覆内容積1㎥当り原液1.0L			
樹木類（枯損木）	林地	カシノナガキクイムシ	被覆内容積1m3当り原液1.0L			加害された枯損木を配置し本剤を散布し、直ちにビニール等で密閉し、くん蒸する。
			1樹当り｛胸高直径（㎝）｝×｛原液12～18ml｝		成虫羽化脱出前	千鳥状に開けた穴に規定量の原液を注入し、くん蒸する。