NCS

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法
ねぎ （春播露地栽培苗床） わけぎ （春播露地栽培苗床） あさつき （春播露地栽培苗床）	一年生雑草	は種14日前まで	原液として 30L/10a	（散布全面処理） 原液を水で3倍に希釈して、 土壌全面に均一に散布し直ちに土壌混和して、 ﾋﾞﾆｰﾙ等で1～2週間間被覆した後、 ガス抜きを行い、ガス抜き7～10日後には種をする。
				（散布表面処理） 原液を水で30倍に希釈して、 ジョウロ等で土壌表面に均一に散布して、ビニール等で 1～2週間被覆した後、ガス抜きを行い、 ガス抜き7～10日後には種をする。
たまねぎ （秋播露地栽培苗床）		は種30日前まで		（散布全面処理） 原液を水で3倍に希釈して、 土壌全面に均一に散布し直ちに土壌混和して、 ﾋﾞﾆｰﾙ等で1～2週間間被覆した後、ガス抜きを行い、 ガス抜き7～10日後には種をする。
				（散布表面処理） 原液を水で30倍に希釈して、 ジョウロ等で土壌表面に均一に散布して、 ビニール等で1～2週間被覆した後、 ガス抜きを行い、ガス抜き7～10日後には種をする。
芝 （目土用土消毒）	一年生雑草 多年生雑草	目土用土作成時	目土用土30倍液 6L/㎥	ジョウロ等で均一に灌注し、ビニール等で7～10間被覆する。
すぎ （は種床）		は種前	原液 3～5ml/1穴	耕起整地後30㎝間隔の千鳥状に深さ約15㎝の穴をあけて 薬液を注入し、ビニール等で10～15日間被覆する。