

ムッシュボルドー DF

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤及び銅を 含む農薬の 使用回数	使用方法			
ぶどう	べと病 さび病	500	200～700L/10a	—	—	散布			
かんきつ	軸腐病(ゆず)	100	0.3～0.5L/樹						
	かいよう病 そうか病	500～1000	200～700L/10a	発生前～発生 初期					
	黒点病	500							
	カタツムリ類 ナメクジ類								
小粒核果類 (すももを除く)	かいよう病				葉芽発芽前ま で				
すもも	黒斑病 ふくろみ病								
もも	縮葉病	500	200～700L/10a	開花前まで					
ネクタリン	せん孔細菌病								
おうとう	褐色せん孔病	500	200～700L/10a	収穫後					
マンゴー	軸腐病								
キウイフルーツ	かいよう病	1000	100～300L/10a	—	—	散布			
はくさい	軟腐病	500							
しょうが	白星病								
アスパラガス	茎枯病								
トマト ミニトマト	疫病								
きゅうり	斑点細菌病								
こんにやく	腐敗病								
ばれいしょ	疫病 軟腐病								
茶	赤焼病 炭疽病 もち病 網もち病						500～1000	200～400L/10a	摘採7日前まで