デュアルサイド水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量（L/10a）	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロピレングリコールモノ脂肪酸エステルを含む農薬の総使用回数	ポリオキシンを含む農薬の総使用回数
りんご	褐斑病 斑点落葉病 ハダニ類	2000	200～700	収穫3日前まで	3回以内	散布	―	5回以内 （散布は3回以内）
なし	うどんこ病			収穫7日前まで	5回以内			5回以内 （イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内）
	ハダニ類 チャノキイロアザミウマ							
ぶどう				収穫60日前まで				5回以内
	灰色かび病							
かき				収穫30日前まで	3回以内			3回以内
	アザミウマ類							
すいか	うどんこ病		100～300	収穫3日前まで	5回以内			5回以内
	ハダニ類 アザミウマ類							
メロン				収穫前日まで				5回以内 （塗布は1回以内
きゅうり	うどんこ病 ハダニ類 アザミウマ類				2回以内			2回以内
なす					3回以内			3回以内
トマト	トマトサビダニ アザミウマ類 葉かび病							
いちご	ハダニ類			収穫開始14日前まで				