

パレード 15 フロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	散布液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用 回数	使用 方法	ピラジフルミドを 含む農薬の 総使用回数
りんご	黒星病 斑点落葉病 輪紋病 すす点病 すす斑病 うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 黒点病 モニリア病	2000～3000	200～700	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	赤星病	2000					
おうとう	灰星病	2000～3000					
	幼果菌核病	2000					
なし	黒星病 輪紋病 うどんこ病 赤星病	2000～3000					
	黒斑病 褐色斑点病	2000					
もも	果実赤点病						
ネクタリン	灰星病 黒星病 うどんこ病	2000～3000					
小粒核果類	すす斑病(うめ)	2000					
	黒星病 灰星病(すもも) 灰色かび病						
ぶどう	黒とう病 さび病 灰色かび病 褐斑病 うどんこ病	2000～3000	収穫7日前まで				
かき	うどんこ病 落葉病		収穫前日まで				
キウイフルーツ							
かんきつ	灰色かび病	20	4～5	収穫7日前まで	無人航空 機による散 布		
		40	8～10				
	そうか病	2000～3000	200～700		散布		
	黒点病	2000					