タチガレエースM液剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ヒドロキシイソキ サゾールを含む 農薬の 総使用回数	メタラキシル及 びメタラキシリ ルMを含む 農薬の総使用 回数
稲(育苗箱)	苗立枯病 (フザリウム菌 苗立枯病 (ピシウム菌)	500~ 1000倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1箱当り希釈液 500ml	は種時又は 発芽後	1 🖸	土壌灌注	3回以内 (移植前の土壌 混和は1回以内、 移植前の土壌灌 注及び灌注は2 回以内)	4回以内 (移植前の土壌 混和は1回以内、 育苗箱への灌注 は1回以内、 本田では2回以 内)
	ムレ苗防止 根の生育促進 移植時の活着促 進	1000倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1箱当り希釈液 1L	・は種時				
稲(湛水直播)	苗腐病 (ピシウム菌)	2.5~5倍	乾燥種籾1kg当り 30ml			鉄コーテイ ング種子 に吹き付 け処理	10	3回以内 (種もみへの処理 は1回以内、本田 では2回以内