

カーニバル水和剤

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	ジメモルフを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	疫病 夏疫病	1000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	3回以内	5回以内	
なす	うどんこ病 すすがび病 灰色かび病 褐色腐敗病	1500倍						4回以内	
トマト	疫病 灰色かび病 葉かび病 うどんこ病	1000倍		収穫前日まで				2回以内	6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内)
ミニトマト									斑点病
きゅうり	炭疽病 うどんこ病 褐斑病 べと病	1500倍		収穫7日前まで				3回以内	14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内)
かぼちゃ	うどんこ病 べと病								3回以内
メロン	うどんこ病 べと病 つる枯病								5回以内
すいか	つる枯病 炭疽病								3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾールの噴射は2回以内)
キャベツ	べと病	1000倍		収穫7日前まで				2回以内	3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
はくさい	べと病 黒斑病 白斑病								3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
ねぎ	さび病 黒斑病 べと病								4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)
たまねぎ	べと病 灰色かび病 白色疫病	1500倍		収穫7日前まで				3回以内	6回以内
レタス	べと病 すそ枯病		5回以内(土壌灌注は2回以内、散布は3回以内)						