

ダイパワー水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イミノクタジン を含む農業の 総使用回数	キャプタンを含 む農業の総使 用回数			
りんご	黒星病	1000	200～700	収穫前日ま で	6回以内(但 し、開花期 以降散布は 3回以内)	散布	8回以内(液剤 及び水和剤は 合計6回以内 (開花期以降 は3回以内)、 塗布剤は2回 以内)	6回以内			
	斑点落葉病 炭疽病 褐斑病 黒点病 輪紋病 すす点病 すす斑病	800～1000									
おうとう	灰星病 幼果菌核病	1000		収穫14日前 まで	3回以内		4回以内	5回以内(塗布 剤は2回以内、 液剤は1回以 内)	9回以内		
かき	うどんこ病									3回以内	5回以内
なし	輪紋病 黒星病 うどんこ病 黒斑病 炭疽病	1000		休眠期	1回		2回以内	3回以内(休眠 期は1回以内、 生育期は1回 以内)	4回以内		
もも	縮葉病									3回以内	4回以内
ぶどう	べと病 黒とう病 晩腐病	100～300		収穫60日前 まで	2回以内		5回以内	7回以内	5回以内(種子粉 衣は1回以内)		
きゅうり	褐斑病 炭疽病 うどんこ病 べと病									7回以内	5回以内(種子粉 衣は1回以内、 は種後は5回以 内)
たまねぎ	灰色かび病									5回以内	6回以内(種子粉 衣は1回以内、 は種後は5回以 内)