

ベトファイター顆粒水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	シモキサニ ルを含む農 薬の総使用 回数	ベンチアバリカ ルブイソプロピ ルを含む農薬 の総使用回数					
ぶどう	べと病	2000～3000	200～700	収穫30日前 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内					
きゅうり				収穫前日ま で									
すいか	褐色腐敗病	2000	100～300	収穫3日前ま で			3回以内	散布	5回以内				
メロン	べと病			収穫14日前 まで									
ねぎ				白色疫病					収穫7日前ま で	3回以内			
たまねぎ	収穫14日前 まで												
らっきょう	疫病			2000～3000					2000	収穫前日ま で	2回以内	3回以内	3回以内
トマト ミニトマト										褐色腐敗病			
なす	疫病			2000					2000	収穫7日前ま で	2回以内	3回以内	3回以内
かぼちゃ	茎疫病									収穫3日前ま で			
だいず	べと病			2000～3000	1500～2000	収穫7日前ま で			2回以内	3回以内	2回以内		
ばれいしょ	疫病			2000～3000		収穫10日前 まで						2回以内	
たばこ		100～180	2回以内		2回以内	2回以内							