キノンドーフロアブル

作物名	適用病害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 黒星病 褐斑病 すす斑病 すす点病 輪紋病 炭疽病	800～1000	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
かき	炭疽病 うどんこ病 落葉病				5回以内		8回以内（塗布は3回以内、散布は5回以内）
なし	黒星病 黒斑病 褐色斑点病 輪紋病	1000		収穫3日前まで	9回以内		12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
みかん	黒点病 そうか病	600～800		収穫30日前まで	5回以内		5回以内
ぶどう	べと病 枝膨病 黒とう病	600		収穫45日前まで	4回以内（開花後は1回）		7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内（但し開花後は1回以内））
いちじく	そうか病			収穫60日前まで	3回以内		3回以内
おうとう	褐色せん孔病	700		収穫終了後～落葉期まで			6回以内（塗布は3回以内、散布は3回以内）
いちご	炭疽病	100	5ml/株	育苗期		クラウン部散布	3回以内
		500～800	100～300L/10a			散布	
メロン	斑点細菌病	1000		収穫10日前まで	5回以内		5回以内
キャベツ	黒腐病	800～1000		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
はくさい	軟腐病	1,000		収穫30日前まで	5回以内		5回以内
レタス	軟腐病 斑点細菌病 腐敗病	500～800		収穫21日前まで			
非結球レタス				収穫30日前まで			
すいか	果実汚斑細菌病 炭疽病	1000		収穫前日まで			
きゅうり	べと病 炭疽病	1200					
	斑点細菌病	1200～1500					
アスパラガス	茎枯病 べと病	600～800		収穫3日前まで			
にんじん	黒葉枯病						
シクラメン	炭疽病	500		発生初期	4回以内		
	葉腐細菌病	5	2～5ml/株			葉柄基部散布	
あじさい	斑点細菌病	500	100～700L/10a		3回以内	散布	