キンセット水和剤 80

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量（L/10a）	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 輪紋病 褐斑病 炭疽病	1000～1200倍	200～700	収穫14日前まで	4回以内	散布	―	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
なし	黒星病 輪紋病			収穫3日前まで	9回以内			12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
みかん	かいよう病 そうか病	1000～1600倍		収穫30日前まで	5回以内			5回以内
かんきつ（みかんを除く）					3回以内			3回以内
おうとう	せん孔病	1000倍		収穫終了後～落葉期まで				6回以内（塗布は3回以内、散布は3回以内
もも	せん孔細菌病 縮葉病			収穫後～開花直前まで　但し、収穫60日前まで	5回以内			8回以内（塗布は3回以内、散布は5回以内
ネクタリン	せん孔細菌病			収穫後～開花直前まで				5回以内
麦類（小麦を除く）	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病	400倍	100～200	根雪前	2回以内			2回以内
小麦	紅色雪腐病	乾燥種子重量の0.5%	―	は種前	1回	種子粉衣（乾粉衣）		5回以内（種子の処理は1回以内）
	紅色雪腐病 条斑病	乾燥種子重量の1%				種子粉衣（湿粉衣）		
	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病	400倍	100～200	根雪前	5回以内	散布		
	眼紋病	400～800倍	60～150	収穫60日前まで				
レタス	軟腐病	1000～1500倍	100～300	収穫21日前まで				5回以内
ばれいしょ		1000～1400倍		収穫14日前まで				
たまねぎ					3回以内			3回以内
だいこん				収穫21日前まで				
にんにく	春腐病	1000倍		収穫7日前まで	5回以内			5回以内