クロピクテープ

作物名	適用病害虫名	使用量	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	苗立枯病（リゾクトニア菌） 苗立枯病（ピシウム菌）	＜床土・堆肥＞2.2m/㎡	2回以内（床土1回以内、圃場1回以内）	土壌くん蒸	3回以内（床土1回以内、圃場2回以内）
	つる割病 ホモプシス腐敗病 ネコブセンチュウ	＜圃場＞110m/100㎡			
すいか	つる割病 ネコブセンチュウ		1回		
メロン	苗立枯病（リゾクトニア菌） 苗立枯病（ピシウム菌）	＜床土・堆肥＞2.2m/㎡	2回以内（床土1回以内、圃場1回以内）		2回以内（床土1回以内、圃場1回以内）
	黒点根腐病 ネコブセンチュウ	＜圃場＞110m/100㎡			
ねぎ	白絹病		1回		3回以内（床土1回以内、圃場2回以内）
わけぎ あさつき					2回以内（床土1回以内、圃場1回以内）
にら	紅色根腐病				2回以内（床土1回以内）
しょうが	根茎腐敗病				
いちご	萎黄病 疫病 ネグサレセンチュウ				3回以内（床土1回以内、圃場2回以内）
ほうれんそう	萎凋病				2回以内（床土1回以内）
かんしょ	ネコブセンチュウ				1回
かぼちゃ	立枯病				
レタス 非結球レタス（サラダ菜を除く）	ビッグベイン病				
サラダ菜					2回以内（床土1回以内、圃場1回以内）
さやえんどう	根腐病 萎凋病				2回以内（床土1回以内）
なす	苗立枯病（リゾクトニア菌）	＜床土・堆肥＞2.2m/㎡			
	青枯病 半身萎凋病	＜圃場＞110m/100㎡			
とうがらし類 ピーマン	苗立枯病（リゾクトニア菌）	＜床土・堆肥＞2.2m/㎡	2回以内（床土1回以内、圃場1回以内）		3回以内（床土1回以内、圃場2回以内）
	青枯病 疫病	＜圃場＞110m/100㎡			
トマトミ ニトマト	萎凋病 褐色根腐病 ネコブセンチュウ				
	苗立枯病（リゾクトニア菌） 苗立枯病（ピシウム菌）	＜床土・堆肥＞2.2m/㎡			
キャベツ	苗立枯病（リゾクトニア菌）		1回		2回以内（床土1回以内、圃場1回以内）
トルコギキョウ	立枯病 根腐病	＜圃場＞110m/100㎡			3回以内（床土1回以内、圃場2回以内）
りんどう	褐色根腐病				
きく	半身萎凋病 立枯病				
カーネーション	萎凋細菌病				
チューリップ	根腐病				