

ドクローラール					
作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農薬の総使用回数
りんご	紋羽病	1穴当り6～12ml	1回	土壌くん蒸	1回
あぶらな科野菜(キャベツ、こなつなを除く)	萎黄病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<床土・堆肥> 1穴当り3～6ml			
こまつな					
だいこん	亀裂掲萎症				
はくさい	黄化病 軟腐病 根くびれ病	<圃場> 1穴当り2～3ml	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	
キャベツ	萎黄病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	
レタス 非結球レタス(サラダ菜を除く)	ビッグベイン病	<圃場> 1穴当り3ml	1回	土壌くん蒸	1回
	根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<圃場> 1穴当り2～3ml			
サラダ菜	ビッグベイン病	<圃場> 1穴当り3ml	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)
	根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草				
ほうれんそう	萎凋病 立枯病 苗立枯病 ハウレンソウケナガコナダニ センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		1回	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内)
うり科野菜(すいか、きゅうり、メロン、にがうり、うり類(漬物用)を除く)	つる割病 白絹病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<床土・堆肥> 1穴当り3～6ml			
漬物用メロン					
にがうり、 うり類(漬物用、ただし、 漬物用メロンを除く)	疫病 つる割病 白絹病 苗立枯病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草				
きゅうり		<圃場> 1穴当り2～3ml	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	2回以内(床土1回以内)	
メロン	つる割病 白絹病 黒点根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	2回以内(床土1回以内)	
かぼちゃ(かぼちゃ台を含む)	フザリウム立枯病	<床土・堆肥> 1穴当り3～6ml	1回	土壌くん蒸	1回
	フザリウム立枯病 一年生雑草	<圃場> 1穴当り3～4ml			
すいか	つる割病 白絹病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<床土・堆肥> 1穴当り3～6ml <圃場> 1穴当り2～3ml	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	土壌くん蒸	3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)
	ホモフシス腐敗病	<圃場> 1穴当り3ml			
ピーマン とうがらし類	萎凋病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	2回以内(床土1回以内)	
トマト ミニトマト	青枯病 萎凋病 半身萎凋病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		1回	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内)
なす	青枯病 半身萎凋病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<床土・堆肥> 1穴当り3～6ml <圃場> 1穴当り2～3ml			
いちご	萎黄病 炭疽病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)	
アスパラガス	立枯病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		1回	2回以内(床土1回以内)	
せり科葉菜類(セルリーを除く)	立枯病(パセリ) センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<圃場> 1穴当り2～3ml		1回	
セルリー	萎黄病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)	
しょうが	根茎腐敗病 一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内)
うど	萎凋病 一年生雑草				
にんじん	センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		1回	1回	
ごぼう	黒あざ病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<床土・堆肥> 1穴当り3～6ml	1回	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内)
かんしょ	立枯病 つる割病 紋羽病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<圃場> 1穴当り2～3ml			
さといも	疫病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		1回	土壌くん蒸	1回
やまのいも	褐色腐敗病 根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草				
ばれいしょ	そうか病	<圃場> 1穴当り3ml	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	土壌くん蒸	3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)
	青枯病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<床土・堆肥> 1穴当り3～6ml			
ねぎ	白絹病 一年生雑草	<圃場> 1穴当り2～3ml	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	
あさつき わけぎ			2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内)
たまねぎ	苗立枯病 一年生雑草				
にんにく	イモグサレセンチュウ 一年生雑草	<圃場> 1穴当り3ml	1回	土壌くん蒸	1回
薬用にんじん	根腐病 一年生雑草				
こんにゃく	乾腐病 白絹病 根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		1回	1回	
豆類(種実 ただし、いんげんまめを除く)			2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内)
豆類(未成熟 ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く)	立枯病 白絹病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草				
さやえんどう 実えんどう いんげんまめ			2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)	
さやいんげん			2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	2回以内(床土1回以内)	
未成熟そらまめ、		<床土・堆肥> 1穴当り3～6ml	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内)
てんさい	黒根病 苗立枯病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<圃場> 1穴当り2～3ml			
あま 麦類	立枯病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		1回	土壌くん蒸	1回
とうもろこし	白絹病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草				
陸稲	センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草		1回	土壌くん蒸	1回
くきちしゃ	ビッグベイン病	<圃場> 1穴当り3ml			
葉しょうが	根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<圃場> 1穴当り2～3ml	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内)
	根茎腐敗病 一年生雑草	<床土・堆肥> 1穴当り3ml <圃場> 1穴当り2～3ml			
ふき ふき(ふきのとう)	半身萎凋病	<圃場> 1穴当り3ml	1回	土壌くん蒸	1回
やまのいも(むかご)	褐色腐敗病 根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<床土・堆肥> 1穴当り3ml <圃場> 1穴当り2～3ml			
らっきょう	白絹病	<圃場> 1穴当り3ml	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	土壌くん蒸	3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)
みつば	立枯病	<圃場> 1穴当り2～3ml			
花き類・観葉植物	青枯病、半身萎凋病 萎凋病(フザリウム菌) 萎黄病(フザリウム菌) 株枯病(フザリウム菌) 乾腐病(フザリウム菌) 球根腐敗病(フザリウム菌) 立枯病(フザリウム菌) 葉枯病(フザリウム菌) 腐敗病(フザリウム菌) センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<床土・堆肥> 1穴当り3～6ml	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)	3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)	
きく	白絹病、立枯病	<圃場> 1穴当り2～3ml	1回	土壌くん蒸	1回
カーネーション	立枯病				
りんどう	褐色腐敗病				
ストック	苗立枯病				
デルフィニウム	立枯病				
スターチス ゆり	萎縮細菌病				
ほおずき	軟腐病				
トルコギキョウ	株腐病、苗立枯病				
イチジク(苗木)	白絹病、センチュウ類	<圃場> 1穴当り3ml			
桑	紋羽病	1穴当り6～12ml			
たばこ	白絹病、立枯病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 一年生雑草	<床土・堆肥> 1穴当り3～6ml <圃場> 1穴当り2～3ml			