メジャーフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数（倍）	散布液量（L/10a）	使用時期	本剤の使用回数	ピコキシストロビンを含む農薬の総使用回数	使用方法
キャベツ	株腐病 菌核病 べと病	2000	100～300	収穫3日前まで	3回以内	3回以内	散布
はくさい	べと病 黒斑病 白斑病 白さび病						
レタス 非結球レタス	べと病 菌核病 灰色かび病 すそ枯病						
たまねぎ	べと病 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 黒かび病			収穫前日まで			
ね ぎ	さび病 べと病 黒斑病 葉枯病 白絹病 黒腐菌核病 小菌核腐敗病						
だいこん	白さび病 ワッカ症			収穫3日前まで			
か ぶ	白さび病			収穫前日まで			
はなやさい類（ブロッコリーを除く）	菌核病 べと病 黒すす病						
ブロッコリー	黒すす病	16	1.6				無人航空機による散布
		20	2.0				
		32	3.2				
にんにく	さび病	2000～3000	100～300	抽苔始め～収穫前日まで			散布
	白絹病	2000					
に ら	白斑葉枯病 白絹病			収穫前日まで			
アスパラガス	茎枯病 斑点病						
にんじん	黒葉枯病			収穫3日前まで			
やまのいも	葉渋病 炭疽病			収穫前日まで			
		20	1.6				無人航空機による散布
		25	2.0				
		40	3.2				
あずき いんげんまめ	灰色かび病 菌核病	2000	100～300	収穫3日前まで			散布
き く	白さび病			発病初期			
トルコギキョウ	斑点病						