

バサグラン液剤(ナトリウム塩)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ペンタゾンを含む農薬の総使用回数			
			薬量	希釈水量						
移植水稻	一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ クサムネ	移植後15～55日 但し 収穫50日前まで	500～700 ml/10a	70～100 L/10a	2回以内	落水散布又は ごく浅く湛水して 散布	2回以内			
直播水稻	一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ	は種後35～50日 但し 収穫50日前まで								
たまねぎ	一年生雑草 (イネ科を除く)	春播栽培の移植後6月 上旬まで 但し収穫30日 前まで	60～120 ml/10a	70～100 L/10a	1回	雑草茎葉散布又 は全面散布	1回			
		秋播栽培移植後生 葉4葉期まで 但し収穫 30日前								
らっきょう		出芽後 但し収穫60日前まで	100～200 ml/10a							
いんげんまめ		初生葉展開期～ 本葉抽出始期	50～70 ml/10a							
えんどうまめ		3～6葉期 但し収穫70日前まで	100～200 ml/10a							
実えんどう さやえんどう		3～6葉期 但し収穫40日前まで								
とうもろこし 餌料用とうもろ こし		生育期 但し収穫50日前まで	100～150 ml/10a							
ソルガム		生育期 但し収穫30日前まで								
麦類(小麦を除 く)		生育期 但し収穫90日前まで	100～200 ml/10a							
小麦										
はとむぎ		生育期 但し収穫45日前まで	150 ml/10a					2回以内	2回以内	
べにばないんげ ん			100～200 ml/10a					1回	畦間雑草 茎葉散布	1回
せり		親株養成期 植付45～60日後まで	200 ml/10a						100 L/10a	
おうぎ		生育期 但し収穫30日前まで	200 ml/10a					100 L/10a	2回以内	2回以内