

アグロスリン乳剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤及びシパル メトリンを含む農 薬の使用回数	使用方法		
かんきつ	カメムシ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ アブラムシ類 チャノキイロアザミウマ ミカンハモグリガ	1000～2000	200～ 700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布		
キウイフルーツ	キイロマイコガ キクビスカシバ キウイヒメヨコバイ カメムシ類							
麦類	アブラムシ類	2000	60～ 150L/10a	収穫21日前まで				
とうもろこし	アブラムシ類 アワノメイガ	1000～2000	100～ 300L/10a	収穫7日前まで				
	アワヨトウ	1000						
だいず	ジャガイモヒゲナガアブラムシ カメムシ類 フタスジヒメハムシ マメシクイガ	2000						
えだまめ	カメムシ類 フタスジヒメハムシ マメシクイガ							
あずき	アブラムシ類 ノメイガ類							
いんげんまめ さやいんげん	アブラムシ類 インゲンテントウ							
未成熟ささげ	アブラムシ類				5回以内			
らっかせい								
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	1000					収穫前日まで	
	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ							
すいか	アブラムシ類	1000～2000		5回以内				
	ミナミキイロアザミウマ							
メロン	アブラムシ類	2000						
	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	1000						
かぼちゃ	アブラムシ類 アザミウマ類 ハスモンヨトウ	2000						収穫7日前まで
ぺぼかぼちゃ (種子)	ヨトウムシ							
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ				5回以内			
なす	ミナミキイロアザミウマ	1000						
いちご ピーマン	アブラムシ類	2000					100～ 500L/10a	3回以内
アスパラガス	ヨトウムシ							
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	5回以内			
	アブラムシ類 アザミウマ類 ネギハモグリバエ	2000						
わけぎ	ネギコガ			1000	収穫3日前まで	2回以内		
	シロイチモジヨトウ							
たまねぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ	2000	2.4L/10a	収穫7日前まで	5回以内	無人航空機による散布		
	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ	48						
にんじん	ヨトウムシ	2000	100～ 300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布		
にら	ネギアザミウマ ヨトウムシ類 ネギコガ				3回以内			
にら(花茎)	ハモグリバエ類 クロバネキノコバエ類							
ごぼう	アブラムシ類 ヒョウタンゾウムシ類	1000		収穫14日前まで	5回以内			
ほうれんそう	ミナミキイロアザミウマ			2000			収穫21日前まで	
	アブラムシ類 ヨトウムシ	2回以内						
チンゲンサイ	アブラムシ類 アオムシ			2000	収穫前日まで		5回以内	2回以内
非結球あぶらな科葉 菜類(チンゲンサイ、 ケールを除く)	アブラムシ類	収穫7日前まで						
レタス				3回以内				
非結球レタス	5回以内	2回以内						
葉にんにく				ネギアザミウマ	2000		収穫前日まで	3回以内
らっきょう	ハスモンヨトウ							
エンサイ		アブラムシ類		2000	収穫7日前まで		1回	
しそ科葉菜類(しそ、 バジルを除く)	アブラムシ類 ヒシモンヨコバイ							
しそ	アブラムシ類	2000		収穫3日前まで	2回以内			
しそ(花穂) バジル	ウリハムシモドキ			2000			収穫35日前まで	
食用ぎく	アブラムシ類 アザミウマ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1500		100～ 300L/10a	収穫3日前まで		1回	
食用プリムラ 食用金魚草 食用エキザカム 食用カーネーション 食用せんにちこう 食用トレニア 食用なでしこ 食用パンジー	アブラムシ類	1500			収穫14日前まで		2回以内	
たばこ	ヨトウムシ タバコアオムシ	2000～3000			25～ 180L/10a		発生初期～収穫 10日前まで	
	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	2000						
きく	アブラムシ類		100～ 300L/10a		発生初期		6回以内	
カーネーション	アブラムシ類 ヨトウムシ類							
しきみ	アブラムシ類	200～ 700L/10a						
さかき	アブラムシ類 サカキブチヒメヨコバイ							
飼料用えんばく(は 種用種子)	コクヌストモドキ	300	種子1kg当 り希釈液 20ml		貯蔵前		1回	種子吹き付け処 理又は塗沫処 理