

アディオオン乳剤							
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペルメトリンを含むの農薬の総使用回数
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類	2000～3000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	ハマキムシ類 カメムシ類	2000倍					
もも	カメムシ類	2000～3000倍		収穫7日前まで	6回以内		6回以内
	アブラムシ類 シンクイムシ類						
	モモハモグリガ ハマキムシ類						
ネクタリン	アブラムシ類 シンクイムシ類	2000～3000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	カメムシ類	2000倍					
	モモハモグリガ	2000～4000倍					
うめ	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
かき	カキノヘタムシガ チャノキイロアザミウマ カメムシ類	2000～3000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内
	カキクダアザミウマ	2000倍					
キウイフルーツ	キイロマイコガ カメムシ類	2000～3000倍	収穫14日前まで	羽化脱出期 但し、 収穫14日前まで	6回以内		
	クリシギソウムシ	2000倍					
くり	クリタマバチ	1000～2000倍	収穫14日前まで	6回以内	6回以内		
	アブラムシ類 ミカンハモグリガ	2000～4000倍					
かんきつ	チャノキイロアザミウマ カメムシ類	2000～3000病 2000病	収穫前日まで	2回以内	2回以内		
	アブラムシ類 アザミウマ類	3000倍					
	イチジクヒトリモドキ	3000倍					
はまなす(果実)	シンクイムシ類	2000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
さるなし	キイロマイコガ	3000病	収穫14日前まで	2回以内	2回以内		
アロニア	シンクイムシ類	2000～3000倍	収穫3日前まで	4回以内	4回以内		
ハスカップ	ハマキムシ類 アブラムシ類	3000倍	収穫14日前まで	4回以内	4回以内		
とうもろこし	アブラムシ類 アワノメイガ	3000倍 2000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類 ウリハムシ	2000～3000倍	収穫7日前まで	5回以内	5回以内		
ズッキーニ	アブラムシ類 フキノメイガ		収穫前日まで	3回以内	6回以内 (乳剤は3回以内、 粒剤は3回以内)		
にがうり	アブラムシ類 カメムシ類 フキノメイガ ヨトウムシ類 タバコカスミカメ		収穫前日まで	3回以内	3回以内		
すいか メロン かぼちゃ	アブラムシ類	3000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
いちご	ヨトウムシ	2000～3000倍	収穫14日前まで	2回以内	2回以内		
ごぼう	アブラムシ類	3000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
葉ごぼう	アブラムシ類	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
非結球あぶらな科葉 菜類(こまつな、非結 球はくさい、みずな、 なばな類を除く)	アオムシ	2000～4000倍	収穫前日まで	5回以内	5回以内 (株元灌注は2回 以内)		
非結球はくさい	アオムシ ハクサイダニ	2000倍	収穫3日前まで	2回以内	2回以内		
こまつな、	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ	4000～8000倍	0.5L/m ²	収穫21日前まで	2回以内	株元灌注	
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ	2000～3000倍	0.5L/m ²	収穫前日まで	5回以内	5回以内 (株元灌注は2回 以内)	
はくさい	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ ハクサイダニ	2000倍	0.5L/m ²	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
だいこん	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ ダイコンハムシ	2000～3000倍	0.5L/m ²	収穫前日まで	4回以内	4回以内	
かぶ	アオムシ	2000倍	0.5L/m ²	収穫前日まで	2回以内	4回以内 (散布は2回以内)	
茎ブロッコリー	アオムシ	2000倍	0.5L/m ²	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
ブロッコリー カリフラワー	コナガ アブラムシ類	2000～3000倍	0.5L/m ²	収穫3日前まで	5回以内	5回以内	
なばな類	コナガ アオムシ	2000倍	0.5L/m ²	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
みずな	アブラムシ類 ヤサイゾウムシ ダイコンハムシ アオムシ	3000倍 2000倍	0.5L/m ²	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
レタス	アブラムシ類 ヨトウムシ	2000～3000倍	0.5L/m ²	収穫前日まで	5回以内	5回以内	
非結球レタス	アブラムシ類 ヨトウムシ	2000～3000倍	0.5L/m ²	収穫前日まで	2回以内	4回以内 (乳剤は2回以内、 粒剤は2回以内)	
トレビス	アブラムシ類	3000倍	0.5L/m ²	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
たまねぎ	アザミウマ類 ネギコガ ハスモンヨトウ	2000～3000倍	0.5L/m ²	収穫前日まで	5回以内	5回以内	
ねぎ	アザミウマ類 ネギコガ シロイチモジヨトウ	2000倍	0.5L/m ²	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
にんにく	アブラムシ類 ネギコガ アブラムシ類	2000～3000倍 32～48倍	1.6L/10a	収穫前日まで	2回以内	4回以内 (乳剤は2回以内、 粒剤は2回以内)	
アスパラガス	ジュウシホシクビナガハ ムシ カメムシ類 アブラムシ類 ヨトウムシ	2000～3000倍 2000倍	1.6L/10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内	
豆類 (未成熟、ただし、 えだまめ、さやいんげ ん、 さやえんどう、 未成熟そらまめを除 く)	アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類	2000～3000倍	1.6L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内	
未成熟そらまめ	ウラナミシジミ アズキノメイガ マメシンクイガ	2000～3000倍	1.6L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
さやいんげん	カメムシ類 アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類 ウラナミシジミ アズキノメイガ マメシンクイガ	2000～3000倍	1.6L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内	
さやえんどう	ナモグリバエ ウラナミシジミ ヨトウムシ類	3000倍	1.6L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
えだまめ	アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類 ウラナミシジミ アズキノメイガ マメシンクイガ ウコンノメイガ ツメクサガ フタスジヒメハムシ マメハンミョウ	2000～3000倍	1.6L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
だいず	アブラムシ類 カメムシ類 マメシンクイガ フタスジヒメハムシ マメハンミョウ ツメクサガ ウコンノメイガ	24倍	0.8L/10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内	
あずき	アズキノメイガ	2000倍	0.8L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
そらまめ	アブラムシ類	3000病	0.8L/10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内	
ほうれんそう	アブラムシ類 ハクサイダニ	3000病	0.8L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内	
はこべ	オオタバコガ	4000倍	0.8L/10a	収穫21日前まで	1回	1回	
しそ	ハスモンヨトウ ウリハムシモドキ アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	4000倍	0.8L/10a	収穫前日まで	2回以内	4回以内 (乳剤は2回以内、 粒剤は2回以内)	
トマト	オンシツコナジラミ アブラムシ類	2000～3000倍	0.8L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
ミニトマト	アブラムシ類	2000～3000倍	0.8L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内	
なす	アブラムシ類	2000～3000倍	0.8L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
	オンシツコナジラミ テントウムシダマシ類 カメムシ類	2000倍	0.8L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
ピーマン	アブラムシ類 タバコガ カメムシ類	2000～3000倍 2000倍	0.8L/10a	収穫前日まで	5回以内	5回以内	
とうがらし類	タバコガ アブラムシ類	2000～3000倍	0.8L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシダマシ類	2000～3000倍	0.8L/10a	収穫14日前まで	4回以内	4回以内	
やまのいも	アブラムシ類 アザミウマ類 ヤマノイモコガ	2000倍	0.8L/10a	収穫7日前まで	5回以内	5回以内	
さといも	ハスモンヨトウ	2000倍	0.8L/10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内	
	アブラムシ類 スズメガ類	3000倍	0.8L/10a	収穫7日前まで	5回以内	5回以内	
さといも(葉柄)	ハスモンヨトウ アブラムシ類	2000倍 3000倍	0.8L/10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内	
かんしょ	イモコガ	4000倍	0.8L/10a	収穫前日まで	5回以内	5回以内	
オクラ	アブラムシ類 ハスモンヨトウ カメムシ類	2000倍	0.8L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
つるむらさき	ヨトウムシ	2000倍	0.8L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
食用ゆり	アブラムシ類	3000倍	0.8L/10a	収穫前日まで	5回以内	5回以内	
食用亜麻	ヨトウガ	2000倍	0.8L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内	
ごま	アブラムシ類 カメムシ類	4000倍	0.8L/10a	収穫3日前まで	3回以内	3回以内	
しゅんぎく	アブラムシ類 ハクサイダニ	4000倍	0.8L/10a	収穫21日前まで	2回以内	2回以内	
茶	チャノココクモンハマキ	2000倍	200～400 L/10a	摘採14日前まで	1回	1回	
	チャノキイロアザミウマ チャノドリヒメコバイ チャノホソガ	2000～3000倍					
花き類・観葉植物 (はぼたんを除く)	アブラムシ類 カメムシ類 ハマキムシ類 ヨトウムシ類	2000～4000倍	100～300 L/10a	発生初期	6回以内	6回以内	
はぼたん	アブラムシ類 カメムシ類 ハマキムシ類 ヨトウムシ類 アオムシ	2000～4000倍 2000倍	100～300 L/10a	発生初期	6回以内	6回以内	
樹木類(くちなしを除 く)	ケムシ類 アブラムシ類 シャクトリムシ類	4000～8000倍	200～700 L/10a	発生初期	6回以内	6回以内	
くちなし	アザミウマ類	2000倍	200～700 L/10a	発生初期	6回以内	6回以内	