

アディオン水和剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペルメリンを含む農薬の総使用回数	
りんご	キンモンホソガ	2000～4000倍	200～700L /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	4回以内 (散布は2回以内、噴射は2回以内)	
	アブラムシ類 シンクイムシ類	2000～3000倍						
	ギンモンハモグリガ	3000倍						
	ハマキムシ類 モモチョッキリゾウムシ	2000倍						
ぶどう	フタテンヒメヨコバイ アメリカシロヒトリ	2000～3000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内	
	チャノキイロアザミウマ							2000～4000倍
	コガネムシ類							2000～3000倍
もも	モモハモグリガ	3000倍		6回以内	6回以内			
	シンクイムシ類	2000～3000倍						
なし	アブラムシ類	2000～3000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内	
びわ			収穫7日前まで	3回以内	3回以内			
うめ	アブラムシ類 アカマダラケシキスイ	2000倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内			
おうとう	ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ							
かき	カキノヘタムシガ ケムシ類	3000倍	収穫7日前まで	5回以内	5回以内			
かりん	シンクイムシ類	2000倍	200～700L /10a	収穫3日前まで	3回以内	3回以内		
オリーブ	オリーブアナアキゾウムシ カメムシ類 ハマキムシ類			収穫7日前まで	2回以内	2回以内		