

アトマイヤーフロアブル											
作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	散布液量(L/10a)	使用方法	使用時期	本剤の使用回数	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数				
だいこん	アブラムシ類	4000	100～300	散布	収穫14日前まで	2回以内	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、は種後の処理は2回以内)				
畑わさび					収穫7日前まで	3回以内	3回以内				
わさび					畑育苗期						
キャベツ					32	1.6～2.0	無人航空機による散布	収穫7日前まで	2回以内	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内)	
					150	4～5					
はくさい					4000	100～300	散布	32	1.6～2.0	無人航空機による散布	
	150	4～5									
みずな	アブラムシ類	4000	100～300	散布	収穫3日前まで	2回以内	2回以内				
未成熟そらまめ					収穫7日前まで (ただし、露地栽培については開花期終了後)		3回以内	3回以内 (定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内)			
未成熟ささげ(施設栽培)					収穫前日まで		2回以内	3回以内 (定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)			
オクラ(施設栽培)					アブラムシ類 アザミウマ類		3回以内	3回以内			
ごぼう	アブラムシ類	4000	100～300	散布	収穫7日前まで	2回以内	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内。)				
葉ごぼう					収穫14日前まで		2回以内				
しそ					収穫3日前まで	3回以内	3回以内				
しそ科葉菜類(しそを除く)					収穫7日前まで						
しそ(花穂)					アブラムシ類 アザミウマ類	4000	100～300	散布	収穫7日前まで	2回以内	2回以内
食用ぎく(施設栽培)									収穫7日前まで		
ふき	アブラムシ類 コナジラミ類	4000	100～300	散布	収穫45日前まで	2回以内	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)				
ふき(ふきのとう)	収穫前日まで										
ほうれんそう	アブラムシ類 アザミウマ類 ウリハムシモドキ	2000	100～300	散布	収穫前日まで	2回以内	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)				
アスパラガス	アザミウマ類				2回以内						
モロヘイヤ	アザミウマ類	2000	100～300	散布	収穫14日前まで	1回	1回				
		2000～4000			2回以内						
ねぎ	ネギハモグリバエ クロバネキノコバエ	200	セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(30～60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	灌注	定植前日～定植時	1回	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内)				
たまねぎ	アザミウマ類	2000～4000	100～300	散布	収穫3日前まで	2回以内	2回以内 (定植時までの処理は1回以内)				
わけぎ あさつき					収穫3日前まで		3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)				
レタス	アブラムシ類	4000	100～300	無人航空機による散布	収穫3日前まで	2回以内	(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内)				
		40			1.6～2.0						
		150			4～5						
非結球レタス	アブラムシ類	4000	100～300	散布	収穫7日前まで	2回以内	2回以内				
		32			1.6～2.0						
		150			4～5						
非結球メキャベツ メキャベツ	アブラムシ類	4000	100～300	散布	収穫7日前まで	2回以内	2回以内				
ふだんそう エンダイブ					収穫7日前まで						
くわい					収穫21日前まで			3回以内	3回以内		
食用さくら(葉)					アザミウマ類			収穫3日前まで	1回	1回	
かんきつ	カイガラムシ類 アザミウマ類 ケシクスイ類 コアオハナムグリ ミカンハモグリガ カメムシ類 アブラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫	2000～5000	200～700	無人航空機による散布	収穫14日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	3回以内	3回以内				
	ミカンバエ	2000～4000									
	ミカンキジラミ	2000									
キウイフルーツ	カメムシ類	2000	200～700	無人航空機による散布	収穫前日まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	2回以内	2回以内				
なし	アブラムシ類	5000	200～700		収穫3日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)						
ぶどう	アザミウマ類				収穫21日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)						
もも	アブラムシ類 モモハモグリガ カメムシ類			収穫3日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)							
あんず	アブラムシ類	2000	200～700	無人航空機による散布	収穫7日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	2回以内	2回以内				
アマランサス(莖葉)	100～300										
びわ	アブラムシ類 カメムシ類	2000	200～700	無人航空機による散布	収穫7日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	3回以内	3回以内				
はまぼうふう(葉)	アブラムシ類	4000	100～300		収穫7日前まで						
さんしょう(葉)					収穫14日前まで			1回	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は1回以内)		
パセリ				2000	2回以内						
ビタヤ	アブラムシ類	4000	100～300	無人航空機による散布	収穫3日前まで	2回以内	2回以内				
アセロラ					収穫7日前まで						
コリアンダー(葉)					収穫3日前まで						
セルリー					収穫7日前まで						
食用プリムラ	収穫14日前まで	2回以内	2回以内								
うど	アブラムシ類	4000	100～300	無人航空機による散布	根株養成期 但し、収穫60日前まで	3回以内	3回以内				
きゅうり(施設栽培)	アブラムシ類 アザミウマ類				収穫前日まで			4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計3回以内)			
せり科葉菜類 (コリアンダー(葉)、セルリー、パセリ、みつば、せりを除く)	アブラムシ類	4000	100～300	無人航空機による散布	収穫14日前まで	1回	1回				
れんこん	アブラムシ類	2000	100～300		収穫14日前まで (ただし、露地栽培については開花期終了後)	2回以内	3回以内 (植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内)				
メロン	アブラムシ類 アザミウマ類				3回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)					
フロccoli	アブラムシ類	2000	100～300	無人航空機による散布	収穫3日前まで	2回以内	4回以内 (育苗期の灌水は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)				
		24			1.6～2.0						
		80			4～5						
かぼちゃ	アブラムシ類	4000	100～300	無人航空機による散布	収穫前日まで (ただし、露地栽培については着果後)	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)				
すいか					収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後)		3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)			
ピーマン(施設栽培)	アブラムシ類	4000	100～300	無人航空機による散布	収穫前日まで	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)				
トマト ミニトマト					収穫前日まで						
なす					アブラムシ類 アザミウマ類		3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計2回以内)				
キノア					カメノコハムシ		2回以内				
やなぎたで	アブラムシ類	2000	100～200	無人航空機による散布	収穫7日前まで	3回以内	3回以内				
いちょう(種子)	イチョウヒゲヒロウド カミキリ幼虫				2000		200～700	収穫3日まで			
食用かえで(葉)	アブラムシ類	4000	100～300	無人航空機による散布	収穫前日まで	2回以内	2回以内				
きく(葉)(施設栽培)					収穫14日前まで						
花き類-観葉植物 (きくを除く)					発生初期			5回以内	5回以内		
きく(施設栽培)	アザミウマ類 アブラムシ類	2000	100～200	無人航空機による散布	発生初期 (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	2回以内	5回以内 (株元灌水は2回以内、土壌混和は2回以内)				
ポインセチア(施設栽培)	コナジラミ類 アブラムシ類										
つつじ類	ツツジグンバイ	5000	1L/m ²	株元灌注	発生前	2回以内	2回以内				
かえで	モミジニタイケアブラムシ										
デイゴ	デイゴヒメコバチ	2000	200～700	散布	ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く	2回以内	2回以内				